

Les résultats doivent être encadrés ou soulignés. Soignez la rédaction.

Exercice 1 *Droites concourantes*

1. Montrer que les droites d'équations respectives $x + y - z - 2 = 2x - y + 3z - 1 = 0$ et $x - 2y - 3 = 3x + 6y - 1 = 0$ sont concourantes.
2. Donner une équation cartésienne du plan qu'elles déterminent.

Exercice 2 *Équation d'une conique*

1. Montrer que l'équation cartésienne (dans un repère orthonormé) d'une conique est du type $(x - a)^2 + (y - b)^2 = (\alpha x + \beta y + \gamma)^2$ si et seulement si elle admet $(a; b)$ comme foyer et la droite d'équation $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$ comme directrice.
2. Interpréter ce résultat en donnant la nature de la conique en fonction de la quantité $\alpha^2 + \beta^2$.
3. Que se passe-t-il si on accepte la valeur 0 pour $\alpha^2 + \beta^2$?

Exercice 3 *À propos des antennes paraboliques*

Soit Γ une parabole d'équation polaire $r = \frac{p}{1 + \cos(\theta)}$. On note \vec{u}_θ et \vec{v}_θ les vecteurs unitaires dirigés par θ et $\theta + \frac{\pi}{2}$ respectivement.

1. En prenant θ comme paramètre, montrer que $\dot{r} = \frac{r(1 - \cos(\theta))}{\sin(\theta)}$ (\dot{r} désigne la dérivée de r par rapport à θ).
2. En prenant θ comme paramètre dans l'expression des coordonnées cartésiennes d'un point M de Γ , montrer que la tangente en M est dirigée par le vecteur $r\vec{v}_\theta + \dot{r}\vec{u}_\theta$ ou encore par le vecteur $(1 - \cos(\theta))\vec{u}_\theta + \sin(\theta)\vec{v}_\theta$ et que la normale est dirigée par $\vec{n} = -\sin(\theta)\vec{u}_\theta + (1 - \cos(\theta))\vec{v}_\theta$. (On précisera les cas d'exception.)
3. Calculer $\vec{n} \cdot \vec{u}_\theta$ et $\vec{n} \cdot \vec{x}$.
4. En déduire la propriété des antennes, miroir et lampes paraboliques : tout rayon parallèle à la direction asymptotique se réfléchit sur la parabole en un rayon passant par le foyer.
5. En déduire également que la tangente en M est bissectrice de (MF) et (MH) (où H est le projeté de M sur la directrice).
6. En déduire que le symétrique du foyer par rapport à la tangente en M appartient à la directrice et que le triangle (FMP) est droit, où P est le point d'intersection de la tangente en M et de la directrice.

Exercice 1 *Droites concourantes*

1. La seconde droite admet \vec{k} comme vecteur directeur, puisque ses équations ne dépendent pas de z , et passe par le point $(5/3; -2/3; 0)$. Or, le point $M(5/3; -2/3; z)$ appartient à la première droite si et seulement si $z = 1$, et donc les deux droites sont concourantes en $A(5/3; -2/3; 1)$. Elles sont donc aussi coplanaires.
2. Un vecteur directeur de la première droite s'obtient par produit vectoriel de deux vecteurs normaux aux plans dont elle est intersection, e.g. $(\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}) \wedge (2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}) = 2\vec{i} - 5\vec{j} - 3\vec{k}$. Or une équation du plan engendré par les deux droites est donnée par l'équation $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0$ où \vec{u} est le produit vectoriel de deux de leurs vecteurs directeurs, e.g. $(2\vec{i} - 5\vec{j} - 3\vec{k}) \wedge \vec{k} = 5\vec{i} + 2\vec{j}$. Ce plan admet donc pour équation $5x + 2y = 7$.

Exercice 2 *Équation d'une conique*

1. Si une conique admet $F(a; b)$ comme foyer et la droite D comme directrice, alors, en notant e son excentricité et $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$ une équation de D , la conique admet pour équation $(x - a)^2 + (y - b)^2 = e^2 \frac{(\alpha x + \beta y + \gamma)^2}{\alpha^2 + \beta^2}$, ou encore

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = \left(\frac{e\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}x + \frac{e\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}y + \frac{e\gamma}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \right)^2$$

ce qui est bien le résultat annoncé puisque la droite D admet aussi comme équation $\frac{e\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}x + \frac{e\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}y + \frac{e\gamma}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} = 0$. Réciproquement une équation $(x - a)^2 + (y - b)^2 = (\alpha x + \beta y + \gamma)^2$ définit une conique de foyer $F(a; b)$, de directrice D d'équation $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$ et d'excentricité $\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ d'après les calculs précédents. D'où l'équivalence recherchée.

2. Puisque $\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ est l'excentricité de la conique, c'est une ellipse, une parabole ou une hyperbole selon que $\alpha^2 + \beta^2$ est strictement inférieur, égal ou strictement supérieur à 1.
3. Si on admet $\alpha^2 + \beta^2 = 0$, on obtient un cercle de centre $(a; b)$ et de rayon $|\gamma|$, qui peut donc être interprété comme une conique d'excentricité nulle.

Exercice 3 *À propos des antennes paraboliques*

1. L'équation polaire est définie pour θ distinct de π modulo 2π et la direction asymptotique est donc $\theta = 0$ $[2\pi]$. On a, pour un tel θ , $\dot{r} = p \sin(\theta) / (1 + \cos(\theta))^2 = r \sin(\theta) / (1 + \cos(\theta))$. De plus, pour θ distinct de 0 modulo π , $\sin(\theta) / (1 + \cos(\theta)) = (1 - \cos(\theta)) / \sin(\theta)$ puisque $\sin^2(\theta) = 1 - \cos^2(\theta)$. Ce qui fournit le résultat annoncé. Par ailleurs $\dot{r}(0) = 0$.
2. Puisque $\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_\theta$, pour θ non nul modulo π , la tangente en M est dirigée par $\vec{t} = r\vec{v}_\theta + \dot{r}\vec{u}_\theta$. Comme r n'est pas nul, on peut prendre \vec{t}/r comme vecteur directeur et même $\sin(\theta)\vec{t}/r$, i.e. $\vec{T} = (1 - \cos(\theta))\vec{u}_\theta + \sin(\theta)\vec{v}_\theta$. Puisque \vec{u}_θ et \vec{v}_θ forment une base orthonormée, un vecteur orthogonal à \vec{T} est $\vec{n} = -\sin(\theta)\vec{u}_\theta + (1 - \cos(\theta))\vec{v}_\theta$, le premier admettant des coordonnées du type $(a; b)$ dans cette base et le second des coordonnées du type $(-b; a)$. Si θ est nul modulo 2π , la tangente en M est verticale et la normale est horizontale (dirigée par \vec{i}).

3. Pour θ non nul modulo π , on a $\vec{n} \cdot \vec{u}_\theta = \sin(\theta)$ et $\vec{n} \cdot \vec{i} = \sin(\theta) \cos(\theta) + (1 - \cos(\theta)) \sin(\theta) = \sin(\theta)$. Par ailleurs, si θ est nul modulo 2π . On a alors $\vec{u}_\theta = \vec{i}$ et $\vec{n} \cdot \vec{i} = 1$.
4. Il en résulte, puisqu'on a affaire à des vecteurs unitaires, $\cos(\widehat{\vec{n}, \vec{u}_\theta}) = \cos(\widehat{\vec{n}, \vec{i}})$. Autrement dit l'angle (géométrique) que fait un rayon parallèle à la direction asymptotique (Ox) avec la normale à la courbe en le point où ce rayon touche la courbe est égal à l'angle (géométrique) entre cette normale et le rayon joignant le point de contact au foyer. D'après les lois de l'optique (lois de Descartes), c'est dire que tout rayon parallèle à la direction asymptotique se réfléchit sur la parabole en un rayon passant par le foyer.
5. La droite (MH) est perpendiculaire à la directrice et est donc parallèle à la direction asymptotique de la parabole. D'après ce qui précède, la normale en M est une bissectrice des droites (MF) et (MH) . L'autre bissectrice est la perpendiculaire à cette première bissectrice, et c'est donc la tangente en M .
6. D'après ce qui précède la droite symétrique de (MF) par rapport à la tangente en M est (MH) . Par conséquent le symétrique de F par rapport à la tangente en M est sur la droite (MH) . Or, par définition de la parabole, $MF = MH$, et donc ce symétrique est le point H , qui appartient bien à la directrice. Le triangle (HMP) est droit en H puisque H est le projeté orthogonal de M sur la directrice qui n'est autre que (HP) . Son symétrique par rapport à la tangente est donc aussi un triangle rectangle. Comme M et P appartiennent à la tangente, ils sont leurs propres symétriques et donc le symétrique du triangle (HMP) est (FMP) . Le triangle (FMP) est donc droit en F .