

Les résultats doivent être encadrés ou soulignés. Soignez la rédaction.

Exercice 1 (à rédiger) *Fonctions monotones - Théorème de la bijection*

On donne ici une démonstration (plus simple) du théorème de la bijection, en n'utilisant que le théorème de Bolzano. Soit f une fonction **monotone** d'un intervalle I **quelconque** de \mathbf{R} à valeurs réelles.

Soit $a \in I$, on rappelle que f admet une limite à gauche (respectivement à droite) en a si la restriction de f à $I \cap]-\infty; a[$ (resp. à $I \cap]a; +\infty[$) admet un prolongement par continuité à $I \cap]-\infty; a]$ (resp. à $I \cap [a; +\infty[$).

1. Montrer que f admet une limite à gauche en a si et seulement si : $\exists \ell \in \mathbf{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, (a - \eta < x < a \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon)$. On note alors $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell$.
2. On suppose f croissante et a distinct de $\inf I$. Montrer que $X = \{f(x) \mid x \in I \text{ et } x < a\}$ est non vide et majoré par $f(a)$, puis que $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ existe et vaut $\sup X$.
3. Indiquer sans démonstration quels ensembles et quelles bornes considérer pour démontrer que toute fonction monotone admet des limites à gauche et à droite en tout point.
4. Soit $f \in C^0(I)$ et J l'intervalle $f(I)$. On suppose de plus que f est strictement monotone. Elle réalise donc une bijection de I sur J et on note g sa bijection réciproque. Montrer que g est une application strictement monotone de J dans I .
5. On garde les hypothèses et notations de la question précédente. Soit a un point de J , montrer que si g n'est pas continue en a , alors $g(a)$ est distinct d'au moins l'une des limites à gauche ou à droite de g en a , puis que g n'atteint aucune des valeurs situées dans l'intervalle ouvert compris entre $g(a)$ et l'une des limites précédentes.
6. En déduire le théorème de la bijection.

Exercice 2 (à chercher) *Lemme de Riemann-Lebesgue*

On se donne θ une fonction continue de \mathbf{R} dans \mathbf{R} et T -périodique, avec $T > 0$, et telle que $\int_{[0;T]} \theta = 0$.

Pour un intervalle compact I , $f \in C_{mex}^0(I)$ et λ réel, on s'intéresse à $L_{f,I}(\lambda) = \int_I f(t)\theta(\lambda t)dt$. On rappelle que, par changement de variables, on a, pour toute fonction continue par morceaux sur $[a; b]$ et tout $(\alpha, \beta) \in \mathbf{R}^* \times \mathbf{R}$, $\int_a^b f(t)dt = \alpha \int_{-\beta+a/\alpha}^{-\beta+b/\alpha} f(\alpha t + \beta)dt$.

1. Montrer que θ est bornée sur \mathbf{R} . On notera $M = \sup_{\mathbf{R}} |\theta|$.
2. Montrer, en utilisant relation de Chasles et périodicité, que pour tout réel a , $\int_{[a;a+T]} \theta = 0$.
3. On suppose $I = [a; b]$, $f = 1_I$ et $\lambda > 0$. En notant n la partie entière de $\lambda(b-a)/T$, montrer $|L_{f,I}(\lambda)| = \frac{1}{\lambda} \left| \int_{\lambda a+nT}^{\lambda b} \theta(t)dt \right| \leq \frac{MT}{\lambda}$ et en déduire $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} L_{f,I}(\lambda) = 0$.
4. On suppose f en escalier sur I , montrer $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} L_{f,I}(\lambda) = 0$.
5. On suppose $f \in C^0(I)$. Soit ε un réel strictement positif. En utilisant l'uniforme continuité de f , montrer qu'il existe g , une fonction en escalier sur I , telle que $\sup_I |f - g| \leq \varepsilon$ et en déduire : $\forall \lambda \in \mathbf{R}, |L_{f,I}(\lambda) - L_{g,I}(\lambda)| \leq M\varepsilon(b-a)$.
6. En déduire, dans le cas général, qu'on a $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} L_{f,I}(\lambda) = 0$ et en particulier $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_I f(t) \sin(nt)dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_I f(t) \cos(nt)dt = 0$.

Ce dernier exercice est à chercher si vous êtes intéressé(e) par une classe *.

Exercice 3 Fonctions continues et topologie

On rappelle (cf. devoir surveillé n° 7) qu'un intervalle compact I satisfait à la propriété de Borel-Lebesgue : de tout recouvrement de I par des intervalles ouverts, on peut extraire un recouvrement fini.

Ceci amène les définitions suivantes, pour X une partie de \mathbf{R} .

1. On dit que X est un voisinage de a si X contient un intervalle **ouvert** contenant a .
2. On dit qu'un réel a est adhérent à X si tout voisinage de a contient un point de X .
3. On dit que X est fermé si tout point adhérent à X appartient à X .
4. On dit X est ouvert si, pour tout point a de X , X est un voisinage de a .
5. On dit que X est compact si pour toute famille $(U_i)_{i \in I}$ d'ouverts telle que $X \subset \bigcup_{i \in I} U_i$, on peut trouver un sous-ensemble **fini** J de I tel que $X \subset \bigcup_{j \in J} U_j$.
6. On dit que X est connexe s'il n'est pas recouvert par deux ouverts disjoints le rencontrant : on ne peut trouver U et V ouverts tels que $U \cap V = \emptyset$, $U \cap X \neq \emptyset$, $V \cap X \neq \emptyset$ et $X \subset U \cup V$.

Avec ces définitions un intervalle ouvert est ouvert, un intervalle fermé est fermé et un intervalle compact est compact ! On rappelle que l'image directe de X par une fonction est l'ensemble $f(X) = \{y \in \mathbf{R} \mid \exists x \in X, y = f(x)\}$ et que l'image réciproque de X est l'ensemble $f^{-1}(X) = \{x \in \mathbf{R} \mid f(x) \in X\}$.

1. Montrer qu'une union quelconque d'ouverts est ouverte et qu'une intersection quelconque de fermés est fermée.
2. Montrer que le complémentaire $\mathbf{R} \setminus X$ de X est fermé si et seulement si X est ouvert.
3. En déduire que si $X \subset Y$ avec X fermé et Y compact, alors X est compact. (On pourra considérer un recouvrement ouvert de X et lui adjoindre $\mathbf{R} \setminus X$ afin de recouvrir Y .)
4. Réciproquement, montrer qu'un compact est fermé. On montrera que son complémentaire est ouvert en prenant a dans $\mathbf{R} \setminus X$ et, pour tout x dans X deux intervalles ouverts disjoints U_x et V_x contenant respectivement x et a . On montrera qu'une intersection finie de V_x constitue un voisinage de a ne rencontrant pas X .
5. Montrer qu'une fonction f de X dans \mathbf{R} est continue si et seulement si l'image réciproque de tout ouvert (resp. fermé) est un ouvert (resp. fermé).
6. Montrer que l'image directe par une fonction continue d'un compact est compacte. En déduire le **théorème de Weierstrass**.
7. En déduire qu'une bijection continue d'un compact X (à valeurs réelles) est un homéomorphisme. Puis en déduire le **théorème de la bijection**. (Utiliser les questions 3 et 5.)
8. Montrer que X est connexe si et seulement s'il n'existe pas de fonction continue de X dans $\{-1; +1\}$.
9. En déduire que l'image directe par une fonction continue d'un connexe est connexe. En déduire le **théorème de Bolzano**.
10. Soit $(K_i)_{i \in I}$ une famille de compacts telle que, pour tout sous-ensemble fini J de I , $\bigcap_{j \in J} K_j$ est non vide. Montrer que $\bigcap_{i \in I} K_i$ est non vide. En déduire que $K = \left\{ \sum_{n=0}^{+\infty} a_n 3^{-n} \mid a_n = 0 \text{ ou } a_n = 2 \right\}$ (ensemble tri-adique de Cantor) est compact.
11. En déduire le **théorème de Bolzano-Weierstrass** : tout sous-ensemble infini d'un compact X admet un point adhérent dans X .
12. En déduire que les trois propriétés suivantes sont équivalentes : (i) X est compact, (ii) X est fermé et borné, (iii) tout sous-ensemble infini de X admet un point adhérent dans X .