

Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans l'ordre qu'on voudra.

On peut admettre des résultats des questions précédentes en le signalant.

Les résultats doivent être encadrés ou soulignés. Merci de soigner la rédaction.

LES CALCULATRICES SONT AUTORISÉES.

Il n'est pas nécessaire de tout aborder pour avoir une bonne note, mais je vous demande d'aborder au moins un problème. Celles et ceux qui sont intéressé(e)s par une classe étoilée peuvent le prouver en abordant les deux problèmes !

Exercice 1 – Formule d'Euler pour $\zeta(2)$

- Justifier que l'équation $2 \sin\left(\frac{t}{2}\right) f(t) = \frac{t^2}{2\pi} - t$ permet de définir une application f de classe C^1 de $[0; \pi]$ dans \mathbf{R} : on justifiera soigneusement la question du prolongement et on précisera la valeur de f et de sa dérivée en 0.
- Calculer $\int_0^\pi \left(\frac{t^2}{2\pi} - t\right) \cos(nt) dt$ pour $n \in \mathbf{N}$.
- Calculer $2 \sin\left(\frac{t}{2}\right) \sum_{k=1}^n \cos(kt)$ pour $n \in \mathbf{N}^*$.
- En déduire, pour $n \in \mathbf{N}^*$, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} + \int_0^\pi f(t) \sin\left(\frac{(2n+1)t}{2}\right) dt$.
- En déduire la valeur de $\zeta(2) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$.

Exercice 2 – Algèbre linéaire

Pour P dans le \mathbf{R} -espace vectoriel $\mathbf{R}_3[X]$, on pose $u(P) = P(X) - P(1 - X)$.

- Montrer que u est un endomorphisme de $\mathbf{R}_3[X]$.
- Écrire la matrice de u dans la base canonique de $\mathbf{R}_3[X]$.
- Calculer le rang de u .
- Déterminer une base du noyau de u et retrouver le résultat précédent.

Exercice 3 – Fonctions de plusieurs variables

Soit f l'application \mathbf{R}^2 dans lui-même définie par $f(x, y) = (x + e^x, x - y)$ et h l'application de \mathbf{R} dans \mathbf{R} donnée par $h(t) = t + e^t$.

- Faire l'étude h et montrer qu'elle est bijective.
- Montrer que f est bijective et en déduire que f est un homéomorphisme de \mathbf{R}^2 dans lui-même.
- Montrer que f est de classe C^1 sur \mathbf{R}^2 et calculer sa matrice jacobienne en tout point (x, y) de \mathbf{R}^2 .
- On note g la bijection réciproque de f . Montrer que g est de classe C^1 sur \mathbf{R}^2 et calculer sa matrice jacobienne au point $(1, 0)$.
- Déterminer les plans tangents à f en $(0, 0)$ et à g en $(1, 0)$.

Problème 1 – Approximations du sinus et du cosinus

1. A tout réel t on associe les suites de fonctions polynomiales $(C_n(t))$ et $(S_n(t))$ définies par

$$C_0(t) = 1 \quad S_0(t) = 0 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbf{N}^* \quad \begin{cases} C_{n+1}(t) = C_n(t) - tS_n(t) \\ S_{n+1}(t) = tC_n(t) + S_n(t) \end{cases}$$

(a) En introduisant $U_n(t) = \cos(nt)$ et $V_n(t) = \sin(nt)$, montrer que, pour t proche de 0, on peut s'attendre à ce que $C_n(t)$ et $S_n(t)$ soient des valeurs approchées de $\cos(nt)$ et $\sin(nt)$.

(b) Calculer C_3 et S_3 .

(c) Montrer que, pour tout x dans $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, on a $x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} \leq x$.

(d) Vérifier que, pour tout x dans $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, on a $x - \frac{x^3}{6} \leq S_3\left(\frac{x}{3}\right) \leq x$.

A-t-on $S_3\left(\frac{x}{3}\right) \leq x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$?

(e) Montrer que, pour t réel, il existe un nombre complexe $z(t)$ tel que, pour tout entier naturel n , on ait $C_n(t) + iS_n(t) = (z(t))^n$ et en déduire que, pour $t \neq 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (C_n(t)^2 + S_n(t)^2) = +\infty$.

Qu'en tirer comme conséquence ?

(f) Étudier le comportement de la suite de fonctions, définies sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ par $f_n(x) = \left(1 + \frac{x^2}{n^2}\right)^n$.

(g) En déduire, pour x fixé, $\lim_{n \rightarrow +\infty} C_n\left(\frac{x}{n}\right) = \cos(x)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n\left(\frac{x}{n}\right) = \sin(x)$.

(h) Comparer $S_6(\pi/180)$, $S_{12}(\pi/360)$ et $\sin(\pi/30)$.

2. On procède maintenant à une approximation grâce à l'équation différentielle $y + y'' = 0$.

(a) Soit f une fonction deux fois dérivable sur \mathbf{R} . Montrer que, pour tout x réel, on a

$$f(x+h) - 2f(x) + f(x-h) = h^2 f''(x) + o_{h \rightarrow 0}(h^2).$$

(b) En déduire que l'on peut s'attendre à ce que, pour t réel, la suite de fonctions polynomiales $(s_n(t))$ définie par

$$s_0(t) = 0, \quad s_1(t) = t, \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbf{N}^*, \quad s_{n+1}(t) - 2s_n(t) + s_{n-1}(t) = -t^2 s_n(t)$$

permette de définir une approximation de $\sin(x)$.

(c) Montrer qu'il existe A et B dans \mathbf{C} vérifiant que, pour tout t réel tel que $|t| < 2$, il existe $u(t)$ dans \mathbf{C} , de module 1 et de partie imaginaire strictement positive, tels que

$$s_n(t) = A(u(t))^n + B(\overline{u(t)})^n.$$

On pourra considérer l'espace des suites réelles vérifiant $u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1} = -t^2 u_n$.

(d) Pour t réel, $|t| \leq \sqrt{2}$, montrer qu'on peut choisir $\theta(t)$ un argument de $u(t)$, avec $0 \leq \theta(t) \leq \pi/2$. Exprimer alors, pour x fixé et n assez grand, $s_n(x/n)$ en fonction de θ , puis de x et n .

(e) Que penser de cette approximation de $\sin(x)$?

Problème 2 – Approximations linéaires

Dans ce problème, on se place dans des espaces \mathbf{R}^p euclidiens canoniques. Une matrice est ainsi identifiée canoniquement à une application linéaire. On note indifféremment A^* ou tA la matrice transposée selon que l'on pense avant tout à la matrice ou à l'endomorphisme adjoint. On rappelle que pour X et Y donnés on a $(AX|Y) = (X|A^*Y)$, où $(\cdot|\cdot)$ désigne le produit scalaire canonique. On note $\|\cdot\|$ la norme euclidienne associée.

On se donne des observations sous la forme de couples (x_i, y_i) et on cherche un couple de réels (a, b) de sorte que la droite d'équation $y = ax + b$ passe le près possible des données observées. Le principe du maximum de vraisemblance consiste à minimiser la fonction $(a, b) \mapsto \sum_{i=1}^n |y_i - (ax_i + b)|^2$.

On pose $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix}$, et il s'agit donc de minimiser la quantité $\|Y - AU\|^2$ pour

$U = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. La droite d'équation $y = ax + b$ ainsi obtenue s'appelle **droite des moindres carrés de y par rapport à x** .

Pour $X = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$, on note $E(X) = \frac{1}{n}(x_1 + \dots + x_n)$ la moyenne des coordonnées de X . Pour $Y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbf{R}^n$, on note $XY = (x_1y_1, \dots, x_ny_n) \in \mathbf{R}^n$ et $X^2 = XX$. Enfin on note $var(X) = E(X^2) - E(X)^2$ la *variance* de X ainsi que $cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ la *covariance* de X et Y . Dans la suite on suppose $n \geq 3$, et X et Y donnés.

1. Analyse de la projection orthogonale sur $Im(A)$.

- A quelle condition A est-elle de rang 2? On supposera cette condition vérifiée par la suite.
- Montrer $\mathbf{R}^n = Ker(A^*) \oplus^\perp Im(A)$ et $Im(A^*) = \mathbf{R}^2$.
- Montrer, pour X dans \mathbf{R}^n , $X \in Ker(A^*A) \Leftrightarrow \|AX\|^2 = 0$ et en déduire $Ker(A^*A) = Ker(A)$.
- En déduire que A^*A est un automorphisme de \mathbf{R}^2 .
- Montrer que $\|Y - AU\|^2$ est minimal lorsque $U = (A^*A)^{-1}A^*Y$.

2. Droite des moindres carrés de y par rapport à x .

- Montrer, à l'aide de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, que $var(X)$ est strictement positive.
- Montrer, à l'aide des formules de Cramer, $a = \frac{cov(X, Y)}{var(X)}$ et $b = E(Y) - \frac{E(X)cov(X, Y)}{var(X)}$.
- Montrer que, si X et Y ont même variance, la droite des moindres carrés de x par rapport à y est symétrique de la droite des moindres carrés de y par rapport à x par rapport à la parallèle à la première bissectrice passant par $(E(X), E(Y))$.
Que se passe-t-il dans le cas général?

3. Droite des moindres carrés pour y et x . On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & y_n \end{pmatrix}$ et $U = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, et on cherche à minimiser $\|AU\|^2$ parmi les vecteurs U tels que $b^2 + c^2 = 1$.
- Interpréter géométriquement la droite d'équation $a + bx + cy = 0$ ainsi obtenue.
 - On note v_1, v_2, v_3 les trois vecteurs colonnes de A . A quelle condition forment-ils une famille liée ?
 - On suppose dorénavant v_1, v_2, v_3 indépendants. On complète cette famille libre en une base $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ de \mathbf{R}^n et on note $(w_i)_{1 \leq i \leq n}$ son orthonormalisée par le procédé de Gram-Schmidt. Enfin note O la matrice de $(w_i)_{1 \leq i \leq n}$ dans la base canonique de \mathbf{R}^n . Montrer que O est orthogonale.
 - Soit V la matrice de $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ dans la base canonique de \mathbf{R}^n . Montrer que tOV est triangulaire supérieure et que ses termes diagonaux sont tous strictement positifs.
 - Montrer que ${}^tOA = R$ est une matrice de taille $(n, 3)$ telle que $r_{i,i} > 0$ pour $1 \leq i \leq 3$ et $r_{ij} = 0$ pour $1 \leq j < i \leq n$.
 - En déduire que $\|AU\|$ est minimal lorsque $\|RU\|$ est minimal.
 - On pose $B = \begin{pmatrix} r_{22} & r_{23} \\ 0 & r_{33} \end{pmatrix}$ et $C = {}^tBB$. Montrer que C admet deux valeurs propres réelles positives.
 - Caractériser, à l'aide de C, U tel que $\|AU\|$ soit minimal.

Question subsidiaire

Sauriez-vous expliquer pourquoi $\sin(11)$ est presque entier (un calcul donne $\sin(11) = -0.999990\dots$) ?