

*On peut admettre des résultats des questions précédentes en le signalant.*

**Les résultats doivent être encadrés ou soulignés. Merci de soigner la rédaction.**  
*LES CALCULATRICES SONT AUTORISÉES.*

### Problème – Étude d’une équation différentielle

Soit  $E = C^\infty(\mathbf{R}, \mathbf{R})$  l’espace vectoriel des fonctions indéfiniment dérivables de  $\mathbf{R}$  dans lui-même. Etant donné deux réels  $\alpha$  et  $\lambda$ , avec  $|\lambda| \leq 1$ , on désigne par  $E_{\alpha,\lambda}$  l’ensemble des applications  $y$  de  $\mathbf{R}$  dans lui-même, dérivables et telles que, pour tout réel  $t$

$$y'(t) = \exp(\alpha t)y(\lambda t).$$

1. Montrer que  $E_{\alpha,\lambda}$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .
2. On suppose dans cette question  $\lambda = 1$  ( $\alpha$  est quant à lui quelconque).
  - (a) Déterminer les éléments de  $E_{\alpha,1}$ .
  - (b) On note  $f_\alpha$  l’unique élément de  $E_{\alpha,1}$  tel que  $f_\alpha(0) = 1$ . Étudier, selon les valeurs de  $\alpha$ , les variations de  $f_\alpha$  et son comportement en  $-\infty$  et  $+\infty$ .
  - (c) On désigne par  $C_\alpha$  le graphe de  $f_\alpha$ . Déterminer le sens de la concavité et la position respective des graphes  $C_\alpha$ .
  - (d) Représenter graphiquement sur une même figure  $C_1, C_0, C_{-1/2}$  et  $C_{-2}$  en marquant précisément les asymptotes, les points d’inflexion, et la tangente au point  $(0, 1)$ . On prendra pour unité 2cm.
3. On suppose dans cette question  $\lambda = -1$  ( $\alpha$  est quant à lui quelconque).
  - (a) Soit  $y$  un élément arbitraire de  $E_{\alpha,-1}$ . Déterminer une équation différentielle  $(L_\alpha)$  linéaire du second ordre et à coefficients constants dont  $y$  est solution.
  - (b) Déterminer les éléments de  $E$  solutions de  $(L_\alpha)$ .
  - (c) Dans chacun des trois cas  $|\alpha| \neq 2$ ,  $\alpha = 2$ ,  $\alpha = -2$ , préciser quelles solutions de  $(L_\alpha)$  appartiennent à  $E_{\alpha,-1}$ . Préciser la dimension de  $E_{\alpha,-1}$ .
4. On suppose dans cette question  $0 < \lambda < 1$  et  $\alpha$  quelconque.
  - (a) Soit  $y$  dans  $E_{\alpha,\lambda}$  telle que  $y(0) > 0$ . Justifier, pour  $x$  réel, qu’on a

$$y(x) = y(0) + \int_0^x \exp(\alpha t)y(\lambda t)dt$$

puis, en considérant  $\inf\{t > 0 \mid y(t) = 0\}$ , montrer que  $y$  est strictement positive sur  $\mathbf{R}_+$ .

- (b) Adapter la question précédente pour montrer que toute solution de  $E_{\alpha,\lambda}$ , pour  $\alpha \geq 1$ , est de signe constant sur  $\mathbf{R}$ .
- (c) Soit  $y$  une application de  $\mathbf{R}$  dans lui-même et  $z$  l’application de  $\mathbf{R}_+^*$  dans  $\mathbf{R}$  définie par  $z(x) = y(\ln(x))$ . Montrer que  $y$  appartient à  $E_{\alpha,\lambda}$  si et seulement si  $z$  est dérivable et vérifie

$$(*) \quad \forall x \in \mathbf{R}_+^*, \quad z'(x) = x^{\alpha-1}z(x^\lambda).$$

5. On suppose dans cette question  $0 < \lambda < 1$  et  $\alpha = 1$ . On se donne une fonction  $z$  vérifiant (\*) ainsi que  $z(1) = 1$ .

- Donner les variations et le signe de  $z$ , de sa dérivée, puis de  $z - Id_{\mathbf{R}_+^*}$ .
- Démontrer que  $z$  admet un prolongement continu en 0 par une valeur  $\ell$  strictement positive.
- Étudier le signe de  $(\lambda + 1)z(x) - x^{\lambda+1} - \lambda$  pour  $x$  positif et en déduire un majorant de  $\ell$  ainsi que la limite de  $z(x)/x$  lorsque  $x \rightarrow +\infty$ .
- Soit  $h$  et  $k$  définies sur  $\mathbf{R}_+^*$  par  $h(x) = z(x)x^{1/(\lambda-1)}$  et  $k(x) = (1 - \lambda)x^{1/\lambda}z(x) - z(x^{1/\lambda})$ . Démontrer que le signe de  $h'(x^{1/\lambda})$  est celui de  $k(x)$ .
- Établir une relation entre  $k'(x)$  et  $k(x^\lambda)$  et en déduire que  $h$  est décroissante.
- Étudier le signe de  $z(x) - x^{1/(1-\lambda)}$  et celui de  $z(x) - (1 - \lambda)^2 x^{1/(1-\lambda)} - \lambda x - \lambda(1 - \lambda)$ .

6. On suppose maintenant  $\lambda = 1/2$  et  $\alpha = 1$ .

- Représenter graphiquement les fonctions définies sur  $\mathbf{R}_+$  par  $\frac{1}{3} + \frac{2}{3}x^{3/2}$ ,  $\frac{1}{4}(x+1)^2$  et  $z(x)$ . On prendra 10cm pour unité.
- Donner les développements limités à l'ordre 2, au voisinage de 1, de  $z$ , ainsi que des fonctions  $f$  et  $g$  définies sur  $]1; +\infty[$  par

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{2 \ln(x)} \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{x^2}{1 + \ln(x)}.$$

- Montrer que, sur  $]1; +\infty[$ , on a  $f'(x) < f(\sqrt{x})$ ,  $g'(x) > g(\sqrt{x})$  et que  $z(x)$  est entre  $f(x)$  et  $g(x)$ .