

Exercice 1 Déterminants

1. Montrer $\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$

2. Étudier $\begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^n \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^n \end{vmatrix}.$

3. Étudier $\begin{vmatrix} 1 & f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_{n-1}(x_1) \\ 1 & f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_{n-1}(x_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & f_1(x_n) & f_2(x_n) & \cdots & f_{n-1}(x_n) \end{vmatrix}$ où les f_k sont des polynômes unitaires de degrés respectifs k .

4. Étudier $\begin{vmatrix} 1 & \binom{x_1}{1} & \binom{x_1}{2} & \cdots & \binom{x_1}{n-1} \\ 1 & \binom{x_2}{1} & \binom{x_2}{2} & \cdots & \binom{x_2}{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \binom{x_n}{1} & \binom{x_n}{2} & \cdots & \binom{x_n}{n-1} \end{vmatrix}$ où on a posé $\binom{x}{k} = \frac{x(x-1)\dots(x-k+1)}{k!}.$

- Montrer que le déterminant de $(1 + x_i y_j)_{1 \leq i, j \leq n}$ est nul pour $n \geq 3$ et les $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ et les $(y_j)_{1 \leq j \leq n}$ dans \mathbf{K} .
- Montrer que le déterminant de $(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, avec $a_{ij} = \binom{j}{i-1}$, est égal à 1.
- Calculer le déterminant de $(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ avec $a_{ij} = 3$ si $i = j$, $a_{ij} = 2$ si $i = j - 1$ et $a_{ij} = 1$ si $i = j + 1$.

Exercice 2 Algorithmes

Dans cet exercice on donne des règles de réécriture : chaque ligne est une règle qui décrit une application. Lorsque l'application n'est pas partout définie, son ensemble de définition est décrit par une condition entre crochets. Appliquer ces règles à un élément a signifie choisir, s'il en existe, une règle applicable à a , remplacer a par le résultat de la règle, disons b , et recommencer avec b , et ainsi de suite tant qu'on peut continuer. La procédure s'arrête quand on ne peut plus continuer.

- Que fait l'algorithme suivant ? On se donne des entiers a et b des entiers avec $b > 0$, on initialise un triplet à $(0, a, b)$ puis on applique les règles suivantes :

$$\begin{aligned} [r < 0] & : (q, r, b) \mapsto (q - 1, r + b, b) \\ [r \geq b] & : (q, r, b) \mapsto (q + 1, r - b, b) \end{aligned}$$

- Et celui-ci ? On se donne a, b et n avec $2^n b > a > 0$ et on initialise un quadruplet à $(n, 0, a, b)$. On applique ensuite les règles :

$$\begin{aligned} [k > 0 \text{ et } r < 2^{k-1}b] & : (k, q, r, b) \mapsto (k - 1, 2q, r, b) \\ [k > 0 \text{ et } r \geq 2^{k-1}b] & : (k, q, r, b) \mapsto (k - 1, 2q + 1, r - 2^{k-1}b, b) \\ [k = 0] & : (k, q, r, b) \mapsto (q, r) \end{aligned}$$

- Et celui-ci ? On se donne A, B des polynômes avec $B \neq 0$ et on initialise un triplet à $(0, A, B)$. On applique ensuite les règles :

$$\begin{aligned} [\deg(R) \geq \deg(V)] & : (Q, R, V) \mapsto (Q + A, R - AV, V) \\ [\deg(R) < \deg(V)] & : (Q, R, V) \mapsto (Q, R) \end{aligned}$$

où on a noté A le monôme quotient des monômes de plus haut degré de R et V , i.e. $A = \frac{\text{dom}(R)}{\text{dom}(V)} X^{\text{deg}(R) - \text{deg}(V)}$ en notant $\text{dom}()$ les coefficients dominants.

- Et celui-ci? On se donne un élément a dans un anneau et m un entier strictement positif. On initialise un triplet à (e, a, m) avec e l'élément neutre pour la multiplication de l'anneau. On applique ensuite les règles :

$$\begin{aligned} [n \text{ pair}] & : (y, x, n) \mapsto (y, x^2, n/2) \\ [n \text{ impair} \neq 1] & : (y, x, n) \mapsto (yx, x^2, (n-1)/2) \\ [n = 1] & : (y, x, n) \mapsto yx \end{aligned}$$

- Estimer le nombre de multiplications nécessitées par l'algorithme précédent.
- On étudie la suite de Fibonacci, donnée par $F_0 = 0, F_1 = 1$ et $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$. Montrer que les coefficients de la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n$ sont des termes de la suite de Fibonacci et les préciser. En déduire un algorithme rapide pour calculer cette suite et préciser la rapidité en la comparant à un algorithme naïf.

Exercice 3 *Algorithme d'Euclide*

On utilise les notations de l'exercice précédent. Commenter les algorithmes suivants.

- On se donne u et v deux entiers naturels et on initialise un couple à (u, v) . On se donne ensuite les règles suivantes :

$$\begin{aligned} [0 < u \leq v] & : (u, v) \mapsto (u, v - u) \\ [0 < v \leq u] & : (u, v) \mapsto (u - v, v) \\ [u = 0] & : (u, v) \mapsto v \\ [v = 0] & : (u, v) \mapsto u \end{aligned}$$

- On se donne x et y deux entiers naturels et on initialise un sextuplet à $(x, 1, 0, y, 0, 1)$. On se donne ensuite les règles suivantes :

$$\begin{aligned} [u \neq 0] & : (u, c, d, v, a, b) \mapsto (v - qu, a - qc, b - qd, u, c, d) \\ [u = 0] & : (u, c, d, v, a, b) \mapsto (v, a, b) \end{aligned}$$

Exercice 4 *Suite de Fibonacci*

La suite de Fibonacci a été définie à l'exercice 2.

- Démontrer que pour tous entiers naturels n et m , on a $F_{n+m} = F_{n+1}F_m + F_nF_{m-1}$.
- En déduire $F_{n+m} \wedge F_m = F_m \wedge F_n$ puis $F_m \wedge F_n = F_{m \wedge n}$.
- Soit $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$. Démontrer qu'on a $F_n = (\varphi^n - (-\varphi)^{-n})/\sqrt{5}$ et que F_n est l'entier le plus proche de $\varphi^n/\sqrt{5}$.
- Soit x et y des entiers tels que $0 < y < x$ et $d = x \wedge y$. Montrer que si l'algorithme d'Euclide appliqué à x et y admet n étapes, alors $x \geq dF_{n+2}$ et $y \geq dF_{n+1}$.
- Montrer que le nombre d'étapes dans l'algorithme d'Euclide appliqué à x et y avec $0 \leq y \leq x$ est inférieur à 5 fois le nombre de chiffres de y en base 10.
- Montrer que le nombre d'étapes précédent est au plus $\frac{3}{2} \log_2(y) + 1$.

Exercice 5 *Nombres premiers*

- En considérant le produit des n premiers nombres premiers, augmenté de 1, montrer que l'ensemble des nombres premiers est infini et que le n^e nombre premier est inférieur à 2^{2^n} . En déduire que le nombre de nombres premiers inférieurs à un réel x , avec $x > 1$, est supérieur à $\log(\log(x))$.
- Démontrer qu'il y a une infinité de nombres premiers de la forme $4n + 3$. Et de même pour ceux de la forme $6n + 5$.