

Dans la suite on fixe n dans \mathbf{N}^* et les lettres a, b, c, \dots désignent des entiers relatifs.

Exercice 1 Anneaux de congruences

1. On note $a \equiv b \pmod n$, ce qui se lit *a est congru à b modulo n*, la propriété $n|(b-a)$, c'est-à-dire qu'on a : $a \equiv b \pmod n \Leftrightarrow \exists k \in \mathbf{Z}, a = b + kn$. Montrer que c'est une relation d'équivalence, i.e. qu'elle est réflexive, symétrique et transitive.
2. On note \bar{a} l'ensemble $\{x \in \mathbf{Z} \mid x \equiv a \pmod n\}$. Montrer qu'on a $\bar{a} = a + n\mathbf{Z}$ et qu'on peut trouver d dans \bar{a} tel que $0 \leq d \leq n-1$.
3. Pour k dans \mathbf{N} et si $a \equiv b \pmod n$, montrer sans faire de récurrence $a^k \equiv b^k \pmod n$.
4. Si $a \equiv b \pmod n$ et $c \equiv d \pmod n$, montrer $a+c \equiv b+d \pmod n$, $a-c \equiv b-d \pmod n$ et $ac \equiv bd \pmod n$.
5. On note $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ l'ensemble des classes d'équivalence pour la relation de congruence modulo n . Montrer que c'est un anneau et que l'application $a \mapsto \bar{a}$ est un morphisme d'anneaux de \mathbf{Z} dans $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$.

Exercice 2 Inversibilité

1. Utiliser une relation de Bézout pour démontrer que a appartient à $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}^\times$ si et seulement si a est premier avec n . En déduire que $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ est un corps si et seulement si n est premier.
2. Si $n \wedge c = d$, montrer $ca \equiv cb \pmod n \Leftrightarrow a \equiv b \pmod \frac{n}{d}$.
3. On appelle système complet de représentants mod n des entiers a_1, a_2, \dots, a_n tels que $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ soit réunion disjointe de $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n$. Si $n \wedge c = 1$ montrer que ca_1, ca_2, \dots, ca_n est aussi un système complet de représentants mod n .
4. Montrer que l'équation $ax \equiv b \pmod n$ admet des solutions si et seulement si, en notant $d = a \wedge n$, d divise b et qu'alors elle a exactement d solutions.

Exercice 3 Corps premiers

On se donne p un nombre premier.

1. Montrer qu'on a $\binom{p}{k} \equiv 0 \pmod p$ pour $1 \leq k \leq p-1$.
2. En déduire $a^p \equiv a \pmod p$.
3. Si $a \not\equiv 0 \pmod p$, montrer qu'on a $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$.
4. Pour $\alpha \in \mathbf{N}^*$, montrer $a \equiv 1 \pmod p^\alpha \Rightarrow a^p \equiv 1 \pmod p^{\alpha+1}$.
5. Montrer que les coefficients de $(1-x)^{-p}$ sont divisibles par p , à l'exception de ceux de degré multiple de p qui sont, eux, congrus à 1 modulo p . On pourra considérer $(1-x^p)^{-1} - (1-x)^{-p}$.

Exercice 4 Unités et fonction d'Euler

1. Si $a \equiv b \pmod n$ et $a \equiv b \pmod m$, montrer $a \equiv b \pmod n \vee m$.
2. On note $\varphi(n)$ le cardinal de $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}^\times$. On appelle système complet de représentants premiers à n des entiers $a_1, a_2, \dots, a_{\varphi(n)}$ tels que $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}^\times$ soit réunion disjointe de $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_{\varphi(n)}$. Si $n \wedge c = 1$ montrer que $ca_1, ca_2, \dots, ca_{\varphi(n)}$ est aussi un système complet de représentants premiers à n .
3. Supposons $n \wedge m = 1$. Si a et b parcourent des systèmes complets de représentants modulo n et m respectivement, montrer que $am + bn$ parcourt un système complet de représentants modulo nm . En déduire que $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ est isomorphe à $\mathbf{Z}/nm\mathbf{Z}$.
4. Montrer que les unités se correspondent et donc que les groupes $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}^\times \times \mathbf{Z}/m\mathbf{Z}^\times$ et $\mathbf{Z}/nm\mathbf{Z}^\times$ sont isomorphes.
5. En déduire que φ est multiplicative au sens suivant : $n \wedge m = 1 \Rightarrow \varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$.

6. Montrer $\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$ où le produit s'étend sur les diviseurs premiers de n .
7. Montrer $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$, où la somme s'étend sur tous les diviseurs positifs de n .
8. Si $a \wedge n = 1$, montrer $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$.

Exercice 5 *Ordre modulo n*

1. Pour a premier à n , soit d la plus petite valeur strictement positive de x pour laquelle $a^x \equiv 1 \pmod n$. On l'appelle *ordre de a modulo n* . Montrer $d|\varphi(n)$. On pourra montrer que l'ensemble des x précédents est un sous-groupe de \mathbf{Z} .
2. Montrer que, pour tout entier a premier à 561, on a $a^{560} \equiv 1 \pmod{561}$. Est-ce que 561 est premier ?
3. Montrer que si a est d'ordre $n - 1$, alors n est premier.


Exercice 6 *Construction de polygones réguliers à la règle et au compas*

On cherche à construire l'angle $\alpha_n = 2\pi/n$ à la règle et au compas, ou encore $\exp(i\alpha_n)$.

1. Montrer que si on sait construire α_n et α_m avec $n \wedge m = 1$, alors on sait construire α_{nm} .
2. On suppose n premier et on s'intéresse aux racines du polynôme $\Phi_n(X) = X^{n-1} + \dots + X + 1$. Exprimer les racines de Φ_3 et Φ_5 uniquement en extrayant des racines carrées.
3. On considère Φ_{17} . Montrer que $e_k = \exp(ik\alpha_{17})$ parcourt les racines de Φ_{17} si k parcourt $\mathbf{Z}/17\mathbf{Z}^\times$.
4. Montrer que 3 est d'ordre 16 modulo 17 et que, pour tout entier m , $-3^m \equiv 3^{m+8} \pmod{17}$.
5. On note $x_i = \sum_{m \equiv i \pmod 2} e_{3^m}$ pour $0 \leq i \leq 1$ et $y_i = \sum_{m \equiv i \pmod 4} e_{3^m}$ pour $0 \leq i \leq 3$. Exprimer les x_i et les y_i comme sommes de cosinus de multiples de α_{17} .
6. Montrer que x_0 et x_1 sont racines de $X^2 + X - 4$ et que x_0 est la plus grande des racines.
7. Montrer que y_0 et y_2 sont racines de $X^2 - x_0X - 1$ et que y_0 est la plus grande des racines.
8. Montrer que y_1 et y_3 sont racines de $X^2 - x_1X - 1$ et que y_1 est la plus grande des racines.
9. Montrer que $2 \cos(\alpha_{17})$ et $2 \cos(4\alpha_{17})$ sont racines de $X^2 - y_0X + y_1$ et en déduire

$$\cos(\alpha_{17}) = \frac{-1 + \sqrt{17} + \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} + \sqrt{68 + 12\sqrt{17} - 16\sqrt{34 + 2\sqrt{17}} - 2(1 - \sqrt{17})\sqrt{34 - 2\sqrt{17}}}}{16}$$

10. Expliquer pourquoi cette méthode, due à Gauß, ne fonctionne que si n est un nombre premier de la forme $2^k + 1$. Montrer qu'alors n est un nombre de Fermat, i.e. de la forme $F_m = 2^{2^m} + 1$.
11. Montrer que F_5 est divisible par 641 en remarquant $641 = 5^4 + 2^4 = 5 \cdot 2^7 + 1$. Pouvez-vous trouver un nombre de Fermat premier pour $m > 4$?



Voici une construction plus géométrique. Soit $(O; \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$ un repère orthonormé et :

- $I = (3O + B)/4$,
- E sur $[OA]$ tel que $\widehat{OIE} = \frac{1}{4}\widehat{OIA}$,
- F sur $[AO)$ tel que $\widehat{EIF} = \frac{\pi}{4}$,
- K l'intersection de $[OB]$ avec le cercle de diamètre $[AF]$ et
- N_3 et N_5 les points d'intersection de (OA) avec le cercle $\mathcal{C}(E; EK)$ avec N_3 sur $[OA]$.

Soit enfin P_3 et P_5 les points d'intersection des perpendiculaires à (OA) passant par N_3 et N_5 respectivement.

1. En notant $\gamma = \widehat{OIE}$, montrer $2 \cos(AOP_3) + 2 \cos(AOP_5) = \tan(\gamma)$ et $2 \cos(AOP_3) \cdot 2 \cos(AOP_5) = \tan(\gamma - \frac{\pi}{4})$.
2. Montrer $y_1 = \tan(\gamma)$ et $y_2 = \tan(\gamma - \frac{\pi}{4})$.
3. En déduire que A, P_3 et P_5 sont les premier, quatrième et sixième sommet d'un polygone régulier à 17 côtés et terminer la construction.