

Exercice 1 *Limites*

Etudier les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x))^{\ln(x)}$.
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x} - 1 - x}{\sin(x)}$.
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)(\cos(x) - 1)}{\sqrt[3]{1-x^3} - 1}$.
4. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{a+x}{a+1} \right)^{x/(x-1)}$ (avec $a > 0$).
5. $\lim_{\substack{x \rightarrow \pi/2 \\ x < \pi/2}} (\tan(x))^{\tan(2x)}$.
6. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x))^{1/x^m}$ pour $m \in \mathbf{R}_+$.

Exercice 2 *Développements limités*

1. Déterminer un équivalent simple, en 0, de $1 - \cos(x) - \ln(\cos(x))$.
2. $DL_3(1)$ de \sqrt{x} .
3. $DL_3(0)$ de $\frac{1+x^2}{3+x}$.
4. $DL_4(0)$ de $\frac{x}{\sin(x)} - \frac{1}{\cos(x)}$.
5. $DL_4(0)$ de $\sqrt{1+\sin(x)} + \exp(\cos(x))$.
6. $DL_4(0)$ de $\exp(x/\cos(x))$.
7. $DL_3(\pi/2)$ de $\ln(\sin(x))$.
8. $DL_9(0)$ de $\sin^6(x)$.
9. $DL_3(1)$ de la fonction arctangente.
10. $DL_1(0)$ de $(1 + \sin(x))^{1/x}$.
11. Ensemble de définition et dérivabilité de $\arccos(4x^3 - 3x)$. Calcul de la dérivée.
12. $DL_5(0)$ de $\cot(x) - 1/x$.
13. Développement généralisé de $\arctan\left(\sqrt{\frac{x+1}{x+3}}\right)$ en $+\infty$, d'ordre 3 par rapport à $1/x$.
14. Déterminer un équivalent simple, en 0, de $\cos(x) - \frac{1+ax^2}{1+bx^2}$ avec a et b réels.
15. Déterminer un équivalent simple, en 0, de $\ln\left(\tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right) - \frac{(1-a)x}{\cos(x)-a}$, avec a réel.
16. Déterminer un équivalent simple, en $+\infty$, de $\sqrt{x^2 - x + 1} + \sqrt[3]{x^3 + ax^2 + 1}$, avec a réel.
17. $DL_3(0)$ de $x \mapsto \frac{\arcsin(\sqrt{x})}{\sqrt{x(1-x)}}$.
18. Montrer que $f(x) = (e^{x^2} - 1)/x$ est prolongeable en un C^∞ -difféomorphisme de \mathbf{R} sur \mathbf{R} et donner un $DL_7(0)$ de sa bijection réciproque.
19. Soit u et v de classe C^3 au voisinage de 0, avec $u(0) = 1$ et $v(0) = 0$. Montrer qu'il existe y définie au voisinage de 0, de classe C^3 , telle que $y^2 - 2uy + v = 0$. En donner un $DL_3(0)$ en fonction de ceux de u et v .

Exercice 3 *Dérivation*

1. Pour $0 < |x| < \pi/2$, montrer $\ln 2 - \frac{x^2}{4} - \frac{x^4}{12} < \ln(1 + \cos(x)) < \ln 2 - \frac{x^2}{4} - \frac{x^4}{96}$.
2. Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbf{R}$ une fonction n fois dérivable. Montrer que si $f(a) = f'(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$ et $f(b) = 0$ alors il existe $c \in]a; b[$ tel que $f^{(n)}(c) = 0$.
3. Soit f dérivable sur $[1; 2]$ telle que $f(1) = f(2) = 0$. Montrer que l'on peut mener par l'origine une tangente au graphe de f .
4. Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbf{R}$ dérivable vérifiant $f(a) = f(b) = 0$, $f'(a) > 0$ et $f'(b) > 0$. Montrer qu'il existe $c_1, c_2, c_3 \in]a; b[$ tels que $c_1 < c_2 < c_3$ et $f'(c_1) = f(c_2) = f'(c_3) = 0$.
5. Soit $f \in C^2([a; b]) \cap D^3(]a; b[)$. Démontrer qu'il existe c dans $]a; b[$ tel que $f(b) = f(a) + \frac{b-a}{2}(f'(a) + f'(b)) - \frac{(b-a)^3}{12}f^{[3]}(c)$.
6. Soit f de \mathbf{R} dans \mathbf{R} dérivable et nulle en 0. Calculer la limite pour n tendant vers $+\infty$ de $\sum_{k=0}^n f(k/n^2)$.
7. Soit f dérivable de \mathbf{R} dans lui-même. Montrer $\forall x \in \mathbf{R}_+, \exists c \in \mathbf{R}_+, f(x) - f(-x) = x(f'(c) + f'(-c))$.
8. Soit g de $[-a; a]$ dans \mathbf{R} , nulle en 0 et de classe C^∞ . On définit f par $f(x) = g(x)/x$. Montrer que f peut se prolonger en une fonction de classe C^∞ sur $[-a; a]$. On pourra montrer $\forall x \in]-a; a[, \exists \theta \in]0; 1[, (n+1)f^{(n)}(x) = g^{(n+1)}(\theta x)$.

Exercice 4 *Étude de fonctions*

Étudier les fonctions suivantes, et tout particulièrement ce qui est singularisé.

1. Soit $f : x \mapsto x \arctan(x-1)$. Placement par rapport aux asymptotes.
2. Soit $f : x \mapsto (x+1) \exp(1/x)$ définie sur \mathbf{R}_+^* . On recherchera notamment une droite asymptote en $+\infty$ à la courbe représentative de f .
3. Soit $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ définie par $\exp(-1/x^2)$ pour $x \neq 0$ et $f(0) = 0$. Étudier la continuité et la dérivabilité en 0 puis montrer que f est de classe C^∞ et que pour tout $n \in \mathbf{N}$, $f^{(n)}(0) = 0$.
4. Soit $f :]-1; +\infty[$ définie par $f(x) = \arctan(\sqrt{(x+1)/(x+3)})$. Montrer que le graphe de f a une asymptote horizontale et préciser sa position par rapport à l'asymptote.
5. Soit $f : \mathbf{R}_+ \rightarrow \mathbf{R}$ définie par $f(x) = x^{x+1}/(x+1)^x$ et prolongée par continuité. Variations, DL en 0, DL généralisé en $+\infty$ en $1/x$, placement par rapport aux asymptotes et tangentes.
6. Soit $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ définie par $f(x) = |\tanh(x)|^{\sinh(x)}$ et prolongée par continuité. Asymptotes, tangente en 0, équivalent de $f(x) - 1$ en 0.

Exercice 5 *Intégration*

1. Calculer la limite pour n tendant vers l'infini de $\int_0^2 \frac{2t+3}{t+2} e^{t/n} dt$.
2. Soit $f \in C^1([0; 1])$, nulle en 0. Montrer $\int_{[0; 1]} f^2 \leq \int_{[0; 1]} (f')^2$.
3. Soit f un C^1 -difféomorphisme de $[0; a]$ dans $[0; b]$. Montrer que, pour tout x dans $[0; a]$, on a $\int_{[0; x]} f + \int_{[0, f(x)]} f^{-1} = xf(x)$.
4. Démontrer que $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n+k}{n^2+k}$ converge et donner sa limite.
5. Soit $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ de classe C^1 et $F : \mathbf{R}^* \rightarrow \mathbf{R}$ définie par $\forall x \neq 0, F(x) = \frac{1}{2x} \int_{-x}^x f(t) dt$. Montrer que F peut être prolongée par continuité en 0. On effectue ce prolongement : montrer que F est dérivable sur \mathbf{R}^* et exprimer $F'(x)$ à l'aide d'une intégrale.