

**Exercice 1** *Trigonométrie*

1. Calculer  $\cos(\pi/9) \cos(2\pi/9) \cos(4\pi/9)$ .
2. Montrer  $\sin(\pi/10) \cos(\pi/5) = 1/4$ .
3. Montrer  $\frac{\cos(\pi/12) + \sin(\pi/12)}{\cos(\pi/12) - \sin(\pi/12)} = \sqrt{3}$ .
4. Si  $\alpha, \beta$  et  $\gamma$  sont les trois angles au sommet d'un triangle, montrer  $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\gamma)$  et  $\sin(2\alpha) + \sin(2\beta) + \sin(2\gamma) = 4 \sin(\alpha) \sin(\beta) \sin(\gamma)$ .
5. Montrer que, pour tout  $x$  réel, on a  $\sin(x) + \sin(x + \frac{2\pi}{3}) + \sin(x + \frac{4\pi}{3}) = 0$ .
6. Montrer que, pour tout  $x$  réel, on a  $\sin(x) + 2 \sin(3x) + \sin(5x) = 4 \cos^2(x) \sin(3x)$ .

**Exercice 2** *Trigonométrie hyperbolique et fonctions réciproques*

1. Montrer  $\forall x \in \mathbf{R}, 2 \operatorname{arctan}(\tanh(x)) = \operatorname{arctan}(\sinh(2x))$ .
2. Montrer  $\forall x \in \mathbf{R}, \sinh(x) = \frac{\tanh(x)}{\sqrt{1-\tanh^2(x)}}$  puis résoudre l'équation en  $x$ ,  $2 \operatorname{argsh}(x) + \operatorname{argth}(\frac{1}{2}) = \operatorname{argch}(3)$ .
3. Montrer  $\forall x \in \mathbf{R}^*, \operatorname{arctan}(x) + \operatorname{arctan}(\frac{1}{x}) = \operatorname{sgn}(x) \frac{\pi}{2}$ .
4. Montrer, pour  $x$  et  $y$  réels vérifiant  $|\operatorname{arctan}(x) + \operatorname{arctan}(y)| \leq \frac{\pi}{2}$ , l'assertion  $\operatorname{arctan}(x) + \operatorname{arctan}(y) = \operatorname{arctan}(\frac{x+y}{1-xy})$ . Que dire dans les autres cas ?
5. Résoudre l'équation en  $x$  réel,  $\operatorname{arctan}(x) - \operatorname{arctan}(\frac{x}{3}) = \arccos(\frac{x}{2})$ .

**Exercice 3** *Formes des nombres complexes*

1. Donner la forme algébrique de  $\frac{3+6i}{3-4i}, \left(\frac{1+i}{2-i}\right)^2 + \frac{1-7i}{4+3i}$  et  $\frac{2+5i}{1-i} + \frac{2-5i}{1+i}$ .
2. Donner la forme exponentielle de  $\frac{3}{1-i}, \frac{(1+i)^3}{1-i} + \frac{(1-i)^4}{(1-i)^2}$  et  $\frac{(\sqrt{6}-i\sqrt{2})(1+i)}{1-i}$ .
3. Donner, pour  $\theta$  réel, la forme trigonométrique de  $\frac{1-\cos(\theta)-i\sin(\theta)}{1+\cos(\theta)-i\sin(\theta)}$ .

**Exercice 4** *Nombres complexes*

1. Résoudre dans  $\mathbf{C}$  l'équation  $z^4 + 1 = 0$ . En déduire une factorisation du polynôme  $X^4 + 1$  en produit de deux polynômes à coefficients réels.
2. Résoudre dans  $\mathbf{C}$  l'équation  $\bar{z} = az + b$ , avec  $a$  et  $b$  complexes, et  $a$  non nul.
3. Montre que, si  $z$  est réel, alors  $\left|\frac{z-i}{z+i}\right| = 1$ . Réciproquement, si  $u = e^{i\theta}$  pour un certain  $\theta$  réel, peut-on écrire  $u$  sous la forme précédente avec  $z$  réel ? A-t-on ainsi construit une bijection entre  $\mathbf{R}$  et  $\mathbf{U}$  ?
4. Soit  $z_1$  et  $z_2$  deux complexes. Montrer que, si un complexe  $u$  vérifie  $u^2 = z_1 z_2$ , alors on a  $|z_1| + |z_2| = \left|\frac{z_1+z_2}{2} + u\right| + \left|\frac{z_1+z_2}{2} - u\right|$ .
5. Soit  $(ABC)$  un triangle du plan. On note  $a, b, c$  les affixes respectives de ses sommets. Montrer que  $(ABS)$  est équilatéral si et seulement si  $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = 0$ .
6. Donner une forme algébrique de  $e^{i\pi/3}$  et de  $e^{-i\pi/4}$ . Donner une forme algébrique du produit et en déduire les valeurs exactes de  $\cos(\pi/12)$  et de  $\sin(\pi/12)$ .
7. Soit  $z$  le complexe  $e^{2i\pi/5}$ . Montrer  $1 + z + z^2 + z^3 + z^4 = 0$ . En déduire  $\cos(\frac{2\pi}{5}) + \cos(\frac{4\pi}{5}) = -\frac{1}{2}$  et  $\cos(\frac{2\pi}{5}) \cos(\frac{4\pi}{5}) = -\frac{1}{4}$ . Donner la valeur exacte de  $\cos(\frac{2\pi}{5})$ .