

Exercice 1 *Intégration*

1. $\int_0^a \left(a^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}}\right)^3 dx$
2. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)\ln(x+\sqrt{1+x^2})}}$
3. $\int_{-\pi}^{\pi} (x^2 + 5x + 6) \cos(2x) dx$
4. $\int_1^2 \sin(\ln(x)) dx$
5. $\int_1^2 \frac{x^3 - 1}{4x^3 - x} dx$
6. $\int_2^3 \frac{x^7 + x^3}{x^{12} - 2x^4 + 1} dx$
7. $\int_0^{\pi/2} \cos^3(x) dx$
8. $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos^5(x)}{\sin^3(x)} dx$
9. $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sqrt{\tan(x)}}$
10. $\int_0^{\pi/2} \frac{1 + \tan(x)}{1 - \tan(x)} dx$
11. $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\cos(x) + 2\sin(x) + 3}$
12. $\int_0^{\pi/2} \frac{1 - \sin(x) + \cos(x)}{1 + \sin(x) - \cos(x)} dx$

Exercice 2 *Équations différentielles*

1. $xy' + y - e^x = 0$ avec $y(a) = b$,
2. $y' - y \tan(x) = \frac{1}{\cos(x)}$ avec $y(0) = 0$,
3. $y'' + y = 2x \cos(x) \cos(2x)$ avec $y(0) = 5$ et $y'(0) = 0$,
4. $y'' - 2y' = e^{2x} + x^2 - 1$ avec $y(0) = 1/8$ et $y'(0) = 1$.
5. Soit la famille d'ellipses d'équations $x^2 + 2y^2 = a^2$. Montrer que l'équation différentielle $x - \frac{2y}{y'} = 0$ admet comme solutions des courbes normales à cette famille et représenter sur un même graphique les deux familles. Faire de même avec les familles : $x^2 + y^2 = a^2$, $y^2 = ax$, $xy = a^2$, $(x-a)^2 + y^2 = a^2$.

Exercice 3 *Suites*

1. On considère, pour α réel, la suite récurrente $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_{n+2} = 2\alpha u_{n+1} - u_n$, $u_0 = 0$ et $u_1 = 1$. Étudier la suite complètement et identifier les cas où elle est de signe constant.
2. Étudier la suite récurrente $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_{n+1} = \frac{u_n}{3 - 2u_n}$.
3. Étudier la suite récurrente définie par $u_{n+1} = 4 \frac{u_n - 1}{u_n}$.
4. Étudier la suite récurrente définie par $x_0 = 0$ et $x_{n+1} = \frac{x_n + 1}{x_n + 2}$.

Exercice 4 *Accélération de convergence*

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbf{N}^*}$ la suite réelle donnée par le périmètre du polygone régulier à 2^{n+1} côté inscrit dans le cercle unité et dont un des sommets est $(1, 0)$. Donner une expression de u_n et montrer qu'on peut la calculer sans connaître la valeur de π .
2. Montrer $x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x$ pour tout réel x et en déduire que la suite converge vers 2π et qu'il existe θ dans $]0; 1[$ et C dans \mathbf{R}^\times tels que $u_n - 2\pi \sim C\theta^n$.
3. On pose $v_n = \frac{u_{n+1} - \theta u_n}{1 - \theta}$, pour n dans \mathbf{N}^* . Montrer que v_n converge vers 2π plus vite que u_n et préciser un équivalent de $v_n - 2\pi$.
4. Soit $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ une suite réelle convergeant vers un réel ℓ . On suppose que la suite de terme général $\frac{u_{n+1} - \ell}{u_n - \ell}$ converge vers un certain θ dans $]0; 1[$. On pose $\theta_n = \frac{u_{n+2} - u_{n+1}}{u_{n+1} - u_n}$ et $v_n = \frac{u_{n+1} - \theta_n u_n}{1 - \theta_n}$. Montrer que v_n converge vers ℓ plus vite que u_n .
5. Faire l'étude de la suite récurrente définie par $u_{n+1} = u_n^{-1} + 1$ et de premier terme 1, grâce à ce qui précède.

Exercice 5 *Calcul différentiel et intégral*

1. Calculer $I_\alpha = \int_0^\pi \ln(1 - 2\alpha \cos(x) + \alpha^2) dx$ grâce à des sommes de Riemann (en prenant ζ_i le plus grand possible et pour une subdivision de pas constant) et montrer $I_\alpha = 0$ si $|\alpha| < 1$ et $2\pi \ln |\alpha|$ si $|\alpha| > 1$. Que dire pour $|\alpha| = 1$?
2. (Escalier du diable) Soit f la fonction définie sur $[0; 1]$ ainsi : si $x = \sum_i a_i 3^{-i}$ est l'écriture en base 3 de x ($a_i \in \{0, 1, 2\}$), alors $f(x)$ s'obtient en convertissant tous les 2 apparaissant avant le premier 1 en 1 et en éliminant tous les autres chiffres, i.e. $f(x) = \sum_{i < j} b_i 2^{-i}$ avec $b_i = a_i/2$ et $j = \min\{k \mid a_k = 1\}$. Montrer que f vaut $1/2$ sur $[1/3; 2/3]$, $1/4$ sur $[1/9; 2/9]$, $3/4$ sur $[7/9; 8/9]$ et qu'elle est continue et croissante (au sens large) sur $[0; 1]$. Montrer de plus qu'elle est dérivable de dérivée nulle en *presque* tous les points de $[0; 1]$. Est-ce un contre-exemple au théorème de Lagrange ?

Exercice 6 *Études d'arcs et de fonctions*

On appelle sommet d'un arc un point où la courbure est extrémale.

1. Développée de $(a(\cos(t) + t \sin(t)), a(\sin(t) - t \cos(t)))$.
2. Montrer que la développée de la parabole $y = x^2$ admet comme équation $y = \frac{1}{2} + 3 \left(\frac{x}{4}\right)^{2/3}$ et trouver ses sommets éventuels.
3. Trouver les sommets de la chaînette $y = a \cosh(x/a)$.
4. Trouver les sommets de $y = \ln(x)$ et de $y = \exp(x)$.
5. Calculer le rayon de courbure et tracer l'astroïde $(a \cos^3(t), a \sin^3(t))$.
6. Montrer que la développée de l'astroïde $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ admet $(x + 3(xy^2)^{1/3}, y + 3(x^2y)^{1/3})$ comme représentation.
7. Construire l'arc $\left(\frac{3at}{1+t^3}, \frac{3at^2}{1+t^3}\right)$ pour a dans \mathbf{R}_+^* .
8. Trouver la parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$ ayant avec la sinusoïde $y = \sin(x)$ une même tangente et une même courbure au point $(0; \pi/2)$.
9. Trouver (a, b, c) tels que la courbe définie par $y = x^3$ si $x \leq 1$ et $y = ax^2 + bx + c$ si $x > 1$ ait une courbure continue.