

Devoir en temps libre à rendre par binôme. Chaque question est rédigée par l'un des membres du binôme, et chacun rédige à peu près la moitié du devoir.

Avertissement : un binôme donné n'est autorisé à rendre qu'un seul DL pendant l'année. Il faut donc changer de partenaire à chaque DL !

Les résultats doivent être encadrés ou soulignés. Soignez la rédaction.

Le 15 décembre 1536 Zuanne de Tonini da Coi propose à Niccolò Fontana dit Tartaglia (« Le Bègue ») le problème suivant (en notations de Viète) :

$$x + y + z = 20$$

$$x : y = y : z$$

$$xy = 8$$

1. Éliminer les variables x et z et expliquer pourquoi Tartaglia n'a pas su résoudre ce problème.
2. Girolamo Cardano transmet le problème à Ludovico Ferrari qui le résout. Reconstruire cette solution grâce aux indications suivantes :
 - (a) Montrer qu'une expression en u de la forme $Au^2 + Bu + C$ peut s'écrire $(\alpha u + \beta)^2$ si et seulement si $B^2 = 4AC$.
 - (b) Partir d'une équation de la forme $u^4 + au^2 = bu + c$ et ajouter $a^2/4$ de chaque côté.
 - (c) En considérant un paramètre v , ajouter $v^2 + av + 2u^2v$ de chaque côté et montrer qu'alors le membre de droite est de la forme $(\alpha u + \beta)^2$ (avec α et β des expressions en a, b, c et v) si et seulement si v satisfait une équation de degré 3 que l'on explicitera.
 - (d) Résoudre cette équation de degré 3 avec la méthode de Tartaglia.
 - (e) Résoudre le problème de Zuanne de Tonini da Coi.
3. Pourquoi Tartaglia était-il bègue ?

1. Remarquons tout d'abord que le problème est exprimé en variables qui sont réelles et même strictement positives. En effet $xy = 8$ nécessite x et y non nuls et de même signe. Comme la seconde équation entraîne $xz = y^2$, z non plus n'est pas nul et est du signe de x . Donc ce signe commun à x , y et z est celui de leur somme, i.e. les inconnues sont à chercher dans \mathbf{R}_+^* .

Soit (x, y, z) dans $(\mathbf{R}_+^*)^3$ et (S) le système proposé à Tartaglia. On a

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 20 \\ xz = y^2 \\ xy = 8 \end{cases}$$

et, par multiplication par y (ce qui préserve les équivalences puisque y est non nul) :

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} xy + y^2 + yz = 20y \\ xyz = y^3 \\ xy = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} xy + y^2 + yz = 20y \\ 8z = y^3 \\ xy = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8 + y^2 + \frac{1}{8}y^4 = 20y \\ z = \frac{1}{8}y^3 \\ x = \frac{8}{y} \end{cases}$$

On voit donc que la résolution de ce système équivaut à celle de l'équation de degré 4

$$y^4 + 8y^2 - 160y + 64 = 0$$

et ceci explique que Tartaglia n'ait pas su résoudre ce problème. C'est en effet Ludovico Ferrari qui résout en toute généralité les équations du quatrième degré.

2. (a) Raisonnons par analyse/synthèse. Si l'expression $Au^2 + Bu + C$ est égale à $(\alpha u + \beta)^2$, alors par identification de coefficients, il vient $A = \alpha^2$, $C = \beta^2$ et $B = 2\alpha\beta$ et donc $B^2 = 4\alpha^2\beta^2 = 4AC$.

Réciproquement si on a $B^2 = 4AC$, choisissons α_1 et β_1 des racines carrées respectives de A et C (éventuellement complexes). On a alors $(2\alpha_1\beta_1)^2 = 4AC = B^2$ et donc $B = \pm 2\alpha_1\beta_1$. Si on a $B = 2\alpha_1\beta_1$, posons $\alpha = \alpha_1$ et $\beta = \beta_1$, et sinon posons $\alpha = -\alpha_1$ et $\beta = \beta_1$. On a alors $B = 2\alpha\beta$ et donc $Au^2 + Bu + C = (\alpha u + \beta)^2$.

Par conséquent une expression en u de la forme $Au^2 + Bu + C$ peut s'écrire $(\alpha u + \beta)^2$ si et seulement si $B^2 = 4AC$.

Remarque : on peut l'écrire directement avec des équivalences. Choisissons a et b des racines carrées de A et C . Remarquons que $2ab$ est une racine carrée de $4AC$. Soit (R) l'assertion « $\exists(\alpha, \beta) \in \mathbf{C}^2, Au^2 + Bu + C = (\alpha u + \beta)^2$ ». Il vient :

$$\begin{aligned} (R) &\Leftrightarrow \exists(\alpha, \beta) \in \mathbf{C}^2, \begin{cases} A = \alpha^2 \\ B = 2\alpha\beta \\ C = \beta^2 \end{cases} \Leftrightarrow \exists(\alpha, \beta) \in \mathbf{C}^2, \begin{cases} A = \alpha^2 \\ B = 2\alpha\beta \\ C = \beta^2 \\ B^2 = 4AC \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \exists(\alpha, \beta) \in \mathbf{C}^2, \begin{cases} \alpha = \pm a \\ B = 2\alpha\beta \\ \beta = \pm b \\ B = \pm 2ab \end{cases} \Leftrightarrow \exists(\varepsilon, \varepsilon') \in \{-1; 1\}^2, \begin{cases} B = 2\varepsilon\varepsilon'ab \\ B = \pm 2ab \end{cases} \\ &\Leftrightarrow B = \pm 2ab \Leftrightarrow B^2 = 4a^2b^2 \Leftrightarrow B^2 = 4AC. \end{aligned}$$

- (b) Le terme $u^4 + au^2 + a^2/4$ est égal à $(u + a/2)^2$ et donc l'équation $u^4 + au^2 = bu + c$ est équivalente à

$$\left(u^2 + \frac{a}{2}\right)^2 = bu + c + \frac{a^2}{4}.$$

- (c) En ajoutant $v^2 + av + 2u^2v$ de chaque côté, le membre de droite devient

$$bu + c + \frac{a^2}{4} + v^2 + av + 2u^2v \quad \text{ou encore} \quad 2vu^2 + bu + \left(c + \frac{a^2}{4} + v^2 + av\right).$$

D'après 2(a), le membre de droite est donc de la forme $(\alpha u + \beta)^2$ si et seulement si

$$b^2 = 4 \cdot (2v) \cdot \left(c + \frac{a^2}{4} + v^2 + av\right),$$

i.e. si et seulement si v est solution de l'équation de degré 3

$$8v^3 + 8av^2 + (8c + 2a^2)v - b^2 = 0.$$

- (d) Ici on a $a = 8$, $b = 160$ et $c = -64$ et donc l'équation cubique précédente s'écrit $8v^3 + 64v^2 - 384v - 25600 = 0$ ou encore $v^3 + 8v^2 - 48v - 3200 = 0$. Comme $(v + 8/3)^3 = v^3 + 8v^2 + 64v/3 + 512/27$, on a

$$\begin{aligned} v^3 + 8v^2 - 48v - 3200 &= \left(v + \frac{8}{3}\right)^3 - \frac{64}{3}v - \frac{512}{27} - 48v - 3200 \\ &= \left(v + \frac{8}{3}\right)^3 - \frac{208}{3}\left(v + \frac{8}{3}\right) + \frac{1664}{9} - \frac{512}{27} - 3200 \end{aligned}$$

ou encore, en posant $t = v + 8/3$,

$$t^3 - \frac{208}{3}t - \frac{81920}{27} = 0.$$

D'après la méthode de Tartaglia, il vient, avec $p = -208/3$ et $q = -81920/27$,

$$4p^3 + 27q^2 = \frac{-4 \cdot 208^3 + 81920^2}{27} = 247218176 = 2^{14} \cdot 79 \cdot 191 = (2^7)^2 \cdot 15089$$

et donc $\sqrt{4p^3 + 27q^2} = 2^7 \sqrt{15089}$. Il vient ainsi

$$\begin{aligned} -\frac{q}{2} + \frac{\sqrt{3}}{18} \sqrt{4p^3 + 27q^2} &= \frac{40960}{27} + \frac{2^6}{9} \sqrt{45267} \\ &= \frac{2^{13}5 + 2^6 3 \sqrt{45267}}{27} \\ &= \left(\frac{4}{3}\right)^3 \left(640 + 3\sqrt{45267}\right) \end{aligned}$$

et enfin

$$t = \frac{4}{3} \sqrt[3]{640 + 3\sqrt{45267}} + \frac{4}{3} \sqrt[3]{640 - 3\sqrt{45267}}.$$

Remarquons que c'est l'unique solution réelle de l'équation cubique, puisque le discriminant $4p^3 + 27q^2$ est positif.

L'unique solution réelle de $8v^3 + 64v^2 - 384v - 25600 = 0$ est

$$v = \frac{4}{3} \left(\sqrt[3]{640 + 3\sqrt{45267}} + \sqrt[3]{640 - 3\sqrt{45267}} - 2 \right).$$

Une valeur approchée est 13,4009.

- (e) Soit donc v donné par l'expression précédente. L'équation $u^4 + 8u^2 = 160u - 64$ s'écrit, après adjonction de $a^2/4$ et $v^2 + av + 2u^2v$

$$(u^2 + 4 + v)^2 = (\alpha u + \beta)^2$$

avec α une racine carrée de $2v$ et $2\alpha\beta = b = 160$, i.e. $\alpha = \sqrt{2v}$ et $\beta = 40\sqrt{2}/\sqrt{v}$.

La résolution de l'équation de degré 4 est donc équivalente à celle de deux équations de degré 2, à savoir

$$u^2 + 4 + v = \pm \left(\sqrt{2vu} + \frac{40\sqrt{2}}{\sqrt{v}} \right)$$

dont les discriminants respectifs sont $-16 - 2v \pm 160\sqrt{2}/\sqrt{v}$. Comme v est positif, le choix d'un signe moins dans cette expression rend le discriminant négatif. Par conséquent, puisqu'on cherche des racines réelles, u vérifie

$$u^2 - \sqrt{2vu} + 4 + v - \frac{40\sqrt{2}}{\sqrt{v}} = 0$$

et donc

$$u = \frac{\sqrt{2v} \pm \sqrt{160\sqrt{2} - 16\sqrt{v} - 2v\sqrt{v}/\sqrt[4]{v}}}{2}$$

ou encore

$$u = \frac{\sqrt{2}v^{3/4} \pm \sqrt{160\sqrt{2} - 16v^{1/2} - 2v^{3/2}}}{2v^{1/4}}.$$

En posant

$$v = \frac{4}{3} \left(\sqrt[3]{640 + 3\sqrt{45267}} + \sqrt[3]{640 - 3\sqrt{45267}} - 2 \right),$$

les réponses au problème de Zuanne de Tonini da Coi sont donc, d'une part,

$$y = \frac{\sqrt{2}v^{3/4} + \sqrt{160\sqrt{2} - 16v^{1/2} - 2v^{3/2}}}{2v^{1/4}}, \quad x = 8/y, \quad z = y^3/8$$

et, d'autre part,

$$y = \frac{\sqrt{2}v^{3/4} - \sqrt{160\sqrt{2} - 16v^{1/2} - 2v^{3/2}}}{2v^{1/4}}, \quad x = 8/y, \quad z = y^3/8.$$

D'une façon approchée, on obtient les triplets (1.67767, 4.76852, 13.5538) et (19.583, 0.408518, 0.008522).

3. Il a été blessé par un coup de sabre à travers le palais, ce qui lui a laissé un défaut de parole.



Niccolò Fontana dit Tartaglia (« Le Bègue »), né à Brescia en 1499 et décédé à Venise en 1557, est un mathématicien italien.

Niccolò Fontana est issu d'une famille pauvre. Lors de la prise de Brescia par les Français en 1512, il se réfugie avec son père dans la cathédrale pour échapper aux envahisseurs. Rien n'y fait, les soldats de Louis XII pénètrent dans le lieu sacré, massacrent son père, et Niccolo est laissé pour mort avec une fracture du crâne et un coup de sabre à travers la mâchoire et le palais. Sa mère le retrouve dans cet état, mais encore vivant. Comme elle n'a rien pour le soigner, elle lèche les plaies de son fils et lui sauve la vie. Cependant la blessure au palais lui laisse un défaut de parole qu'il conserve toute sa vie, ce qui lui vaut son surnom « Tartaglia », tartagliare signifiant bégayer en italien. Sa mère économise pour permettre à son fils de suivre l'école pendant quinze jours. Le jeune Niccolo vole alors des livres et des cahiers pour continuer à apprendre en autodidacte. Manquant de papier, il utilise les pierres tombales comme ardoise. Devenu adulte, il gagne sa vie en enseignant les mathématiques dans différentes villes d'Italie et en participant à des concours.

La suite sur Wikipedia :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Niccolo_Fontana_Tartaglia.