

*Il n'est pas nécessaire de toute traiter pour avoir une bonne note.
 Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans l'ordre qu'on voudra.
 On peut admettre des résultats des questions précédentes en le signalant.
 Enfin, les résultats doivent être encadrés ou soulignés. Merci de soigner la rédaction.
 LES CALCULATRICES SONT INTERDITES*

Dans tous les exercices l'espace \mathcal{E} est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Exercice 1

Étudier dans les cas suivants l'intersection du plan $P(A; \vec{u}, \vec{v})$ passant par A et dont la direction admet (\vec{u}, \vec{v}) comme base, et du plan P' donné par l'équation cartésienne $x + 6y + 5z = 1$. Dans le cas où elle est non vide, on donnera une représentation paramétrique de l'intersection.

1. $A = (1, 1, 2)$, $\vec{u} = (1, 1, 1)$, $\vec{v} = (2, 0, 1)$.
2. $A = (1, -1, 0)$, $\vec{u} = (1, -1, 1)$, $\vec{v} = (1, -6, 7)$.
3. $A = (3, 5, -1)$, $\vec{u} = (1, 1, -1)$, $\vec{v} = (-3, 2, -1)$.
4. $A = (1, 4, -5)$, $\vec{u} = (-1, 1, -1)$, $\vec{v} = (4, 1, -2)$.

Exercice 2

On définit trois plans par des équations cartésiennes, en fonction d'un paramètre λ réel :

$$P_\lambda : \lambda x + 2y + z - 1 = 0 \quad Q_\lambda : x + (\lambda + 1)y - z + 1 = 0 \quad R_\lambda : 4x + 8y + (3 - 2\lambda)z + 1 = 0 .$$

1. Déterminer pour quelle(s) valeur(s) de λ ces trois plans ont une droite en commun. On note D_λ cette droite et donner une représentation paramétrique de D_λ .
2. Donner trois droites appartenant respectivement aux plans P_λ , Q_λ et R_λ telles que D_λ soit leur perpendiculaire commune.

Exercice 3

On considère les plans Q_1 et Q_2 d'équations respectives $Q_1 : x + 2y - z + 1 = 0$ et $Q_2 : x - y + 2z - 2 = 0$, et $D = Q_1 \cap Q_2$. Soit Δ la droite d'équations cartésiennes : $2x - y + 1 = z = 0$.

1. Montrer que D est une droite et en donner une représentation paramétrique.
2. Déterminer une perpendiculaire commune à D et Δ et calculer la distance $d(D, \Delta)$.
3. Pour a et b réels, soit $P_{a,b}$ le sous-ensemble de \mathcal{E} défini par l'équation

$$a(x + 2y - z + 1) + b(x - y + 2z - 2) = 0 .$$

En fonction des valeurs de (a, b) et (a', b') , donner la nature et les propriétés de $P_{a,b}$ et à quelle condition $P_{a,b}$ et $P_{a',b'}$ coïncident.

4. Pour quelles valeurs de (a, b) , $P_{a,b}$ est-il perpendiculaire à Q_1 ?
5. Soit \mathcal{S} le sous-ensemble de \mathcal{E} défini par l'équation

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 1 = 0 .$$

Justifier que \mathcal{S} est une sphère dont on précisera le centre A et le rayon R .

6. Pour tout réel m , calculer la distance d_m définie par $d_m = d(A, P_{1,m})$.
7. Pour quelles valeurs de (a, b) , $P_{a,b}$ est-il tangent à \mathcal{S} ?
8. Justifier que $P_{1,1} \cap \mathcal{S}$ est un cercle dont on précisera le centre B et le rayon r .


Problème - Le système mondial de navigation par satellite

1. Pour i entier entre 1 et 3, on se donne des sphères S_i , de centre A_i et de rayon R_i : $S_i = S(A_i; R_i)$. On note, pour $1 \leq i, j \leq 3$, $d_{i,j}$ la distance $A_i A_j$ et $\Pi_{i,j}$ le lieu des points M de \mathcal{E} tels que $A_i M^2 - R_i^2 = A_j M^2 - R_j^2$.
 - (a) Rappeler à quelle condition l'intersection $S_1 \cap S_2$ contient strictement plus qu'un point. Quelle est alors la nature de l'intersection ?
 - (b) Quelle est la nature et le nom de $\Pi_{1,2}$? A quelle condition $\Pi_{1,2}$ est-il parallèle à $\Pi_{1,3}$?
 - (c) On suppose que A_1 , A_2 et A_3 sont sur une sphère et sont tous distincts. En considérant $\Pi_{1,2} \cap \Pi_{1,3}$, montrer que $S_1 \cap S_2 \cap S_3$ a au plus deux éléments.
2. On se donne maintenant quatre points $(A_i)_{1 \leq i \leq 4}$ sur une sphère et quatre réels $(t_i)_{1 \leq i \leq 4}$. Soit M un point de l'espace et t un réel vérifiant : pour $1 \leq i \leq 4$, $A_i M = c(t_i - t)$.
 - (a) Montrer que les coordonnées de M peuvent s'exprimer linéairement en fonction de t et que t vérifie une équation du second degré.
 - (b) On prend $A_1(0.94, 2.05, 0)$, $t_1 = 19.9$, $A_2(1.95, 0, 2.06)$, $t_2 = 2.4$, $A_3(1.02, 0.88, 1.14)$, $t_3 = 32.6$, $A_4(2.03, 0.97, 0)$, $t_4 = 19.9$ et $c = 0.047$. Montrer que t vérifie $0.021t^2 - 1.936t + 44.436 \simeq 0$.
 - (c) On suppose de plus que M est sur la sphère unité. La valeur de t correcte est-elle la plus grande ou la plus petite des deux possibles ? Estimer les coordonnées de M .
3. On place 27 satellites $(P_i)_{1 \leq i \leq 27}$ en orbite autour de la Terre. On les répartit dans trois plans orbitaux faisant un angle de 56° avec le plan de l'équateur, à une altitude de 23 616 km, de sorte que dans chaque plan il y ait neuf satellites situés à intervalles réguliers. La période orbitale est de 14h 21mn. Les satellites émettent des signaux répétés périodiquement, et en continu. Les positions des satellites, les instants d'émission des signaux etc. sont stockés dans la mémoire d'un récepteur situé en un point M . Le récepteur mesure la durée d_i mise par le signal émis par le satellite P_i de sorte que, en supposant que le signal se propage à la vitesse c de la lumière, le récepteur se trouve sur une sphère de centre A_i et de rayon $r_i = cd_i$.
 - (a) On suppose les horloges des satellites et du récepteur toutes synchronisées. Montrer que les données transmises par trois satellites suffisent à déterminer la position du récepteur.
 - (b) On suppose seulement les horloges des satellites synchronisées. Montrer qu'il faut maintenant quatre ensembles de données satellitaires pour déterminer la position du récepteur. Y a-t-il des cas où trois satellites suffisent à se repérer ?
 - (c) On écrit $A_i(a_i, b_i, c_i)$. Montrer que l'on a intérêt à choisir les quatre satellites de sorte que l'angle entre les plans tangents en M aux sphères $S(A_i; A_i M)$ soit le plus grand possible.
 - (d) Montrer qu'on a intérêt à choisir $\left| \begin{array}{ccc} a_4 - a_1 & a_4 - a_2 & a_4 - a_3 \\ b_4 - b_1 & b_4 - b_2 & b_4 - b_3 \\ c_4 - c_1 & c_4 - c_2 & c_4 - c_3 \end{array} \right|$ le plus grand possible.
4. Dans un système de navigation, on ne se sert pas de coordonnées cartésiennes, mais plutôt de coordonnées sphériques. Celles-ci sont obtenues à partir de cartes, i.e. de projections de la Terre (assimilée en première approximation à une sphère) sur un plan. On choisit un repère cartésien telle que la Terre admette $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ comme équation et un repère polaire associé aux longitude et latitude. On rappelle que le lien entre les coordonnées cartésiennes $u = (x, y, z)$ d'un

point et ses coordonnées polaires (ρ, θ, φ) est donné par : $x = \rho \cos(\theta) \cos(\varphi)$, $y = \rho \sin(\theta) \cos(\varphi)$ et $z = \rho \sin(\varphi)$.

- (a) On note $\frac{du}{d\theta}$ le vecteur obtenu en dérivant x , y et z par rapport à θ et $\frac{du}{d\varphi}$ celui obtenu en dérivant par rapport à φ . Autrement dit $\frac{du}{d\theta} = (-\rho \sin(\theta) \cos(\varphi), \rho \cos(\theta) \cos(\varphi), 0)$ et $\frac{du}{d\varphi} = (-\rho \cos(\theta) \sin(\varphi), -\rho \sin(\theta) \sin(\varphi), \rho \cos(\varphi))$. On appelle élément de surface la quantité $\left\| \frac{du}{d\theta} \wedge \frac{du}{d\varphi} \right\|$. Calculer cet élément de surface en un point de la sphère.
- (b) La projection cylindrique de Lambert (connue d'Archimède) associe à un point de la sphère d'équation $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ celui du cylindre d'équation $x^2 + y^2 = R^2$ ayant la même hauteur. Plus précisément au point de coordonnées sphériques (ρ, θ, φ) , on associe le point de coordonnées cylindriques (ρ, θ, φ) . Exprimer la projection $u' = (x', y', z')$ de (x, y, z) en fonction des coordonnées polaires de (x, y, z) . Montrer que l'élément de surface $\left\| \frac{du'}{d\theta} \wedge \frac{du'}{d\varphi} \right\|$ est identique au précédent. On dit que la projection est équivalente, ou encore qu'elle préserve les aires.
- (c) La projection de Mercator est également une projection cylindrique, mais la formule est différente. On pose $u'' = (x'', y'', z'') = (\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \rho \ln(\tan((\varphi + \pi/2)/2)))$. Interpréter cette projection.
- (d) On étudie les courbes tracées sur la sphère et sur la carte en faisant varier (θ, φ) suivant une droite et notamment l'angle entre deux telles courbes. Soit $\theta_0, \varphi_0, \alpha$ et β quatre réels. On pose, pour t réel, $v(t) = (\theta_0 + t \cos(\alpha), \varphi_0 + t \sin(\alpha))$ et $w(t) = (\theta_0 + t \cos(\beta), \varphi_0 + t \sin(\beta))$.
- On note $v_1(t)$ et $w_1(t)$ les vecteurs de \mathbf{R}^3 dont les coordonnées polaires sont $v(t)$ et $w(t)$ respectivement. Calculer les vecteurs $v'_1(0)$ et $w'_1(0)$ dont les coordonnées sont obtenues en dérivant celles de $v_1(t)$ et $w_1(t)$ par rapport à t , puis en prenant la valeur de cette dérivée en 0.
 - Faire de même pour calculer $v'_2(0)$ et $w'_2(0)$ à partir d'un vecteur de \mathbf{R}^3 obtenu en remplaçant dans u'' les valeurs de (θ, φ) par $(v(t), w(t))$.
 - Montrer que l'angle entre $v'_1(0)$ et $w'_1(0)$ est égal à celui entre $v'_2(0)$ et $w'_2(0)$. On dit que la projection est conforme, ou encore qu'elle préserve les angles.
- (e) Montrer qu'une projection de la sphère sur le plan ne peut pas à la fois préserver les angles et les aires.

Question subsidiaire : qui sont ces quatre personnes ?



Exercice 1

Soit \vec{n} le vecteur de coordonnées $(1; 6; 5)$, c'est un vecteur normal à P' et un point M de l'espace appartient à P' si et seulement si $\overrightarrow{OM} \cdot \vec{n} = 1$. De plus ce point M appartient à P si et seulement s'il existe deux scalaires a et b tels que $M = A + a\vec{u} + b\vec{v}$. L'intersection de P et P' est donc constitué des points M avec a et b , dans l'écriture précédente, vérifiant (*) $(\vec{u} \cdot \vec{n})a + (\vec{v} \cdot \vec{n})b + \overrightarrow{OA} \cdot \vec{n} = 1$. Il vient :

1. Dans le cas $A = (1, 1, 2)$, $\vec{u} = (1, 1, 1)$, $\vec{v} = (2, 0, 1)$, l'équation (*) s'écrit $12a + 7b + 17 = 1$. On prend $t = a/7$ comme paramètre et on a $b = -12t - 16/7$. On a donc $M = (A - 16\vec{v}/7) + t(7\vec{u} - 12\vec{v})$.
Une représentation paramétrique de $P \cap P'$ est $(-25/7 - 17t; 1 + 7t; -2/7 - 5t)$, pour $t \in \mathbf{R}$.
2. Dans le cas $A = (1, -1, 0)$, $\vec{u} = (1, -1, 1)$, $\vec{v} = (1, -6, 7)$, l'équation (*) s'écrit $-5 = 1$ et n'a pas de solution. Les deux plans P et P' sont strictement parallèles et sont d'intersection vide.
3. Dans le cas $A = (3, 5, -1)$, $\vec{u} = (1, 1, -1)$, $\vec{v} = (-3, 2, -1)$, l'équation (*) s'écrit $2a + 4b + 28 = 1$. On prend $t = b$ comme paramètre. On a donc $M = (A - 27\vec{u}/2) + t(-2\vec{u} + \vec{v})$.
Une représentation paramétrique de $P \cap P'$ est $(-21/2 - 5t; -17/2; 25/2 + t)$, pour $t \in \mathbf{R}$.
4. Dans le cas $A = (1, 4, -5)$, $\vec{u} = (-1, 1, -1)$, $\vec{v} = (4, 1, -2)$, l'équation (*) s'écrit $0 = 1$ et n'a pas de solution. Les deux plans P et P' sont strictement parallèles et sont d'intersection vide.

Exercice 2

1. Soit λ un réel. En raison des coefficients de z et constants, les équations de P_λ et Q_λ définissent des plans et ces plans ne sont parallèles (ou confondus) que si $\lambda = -1$ et $2 = -(\lambda + 1)$, ce qui est impossible. Ces deux plans se coupent donc selon une droite D_λ . Aussi les trois plans P_λ , Q_λ et R_λ ont une droite en commun si et seulement si D_λ est incluse dans R_λ , ou encore si et seulement si l'équation cartésienne (R_λ) de R_λ que l'on s'est donnée est combinaison linéaire des équations cartésiennes (P_λ) et (Q_λ) de P_λ et Q_λ . Cette dernière condition s'écrit : il existe deux scalaires, non nuls tous les deux, a et b tels que

$$a(\lambda x + 2y + z - 1) + b(x + (\lambda + 1)y - z + 1) = 4x + 8y + (3 - 2\lambda)z + 1 = 0$$

ou encore $a\lambda + b = 4$, $2a + (\lambda + 1)b = 8$, $a - b = 3 - 2\lambda$ et $b - a = 1$. Ces deux dernières équations équivalent à $\lambda = 2$ et $b - a = 1$, et donc le système équivaut à $\lambda = 2$, $2a + b = 4$, $2a + 3b = 8$ et $b - a = 1$. Par conséquent les trois plans P_λ , Q_λ et R_λ ont une droite en commun si et seulement si $\lambda = 2$ et alors $(R_2) = (P_2) + 2(Q_2)$. La droite D_2 admet pour équations cartésiennes $x + 3y - z + 1 = 4x + 8y - z + 1 = 0$. En prenant $t = y/3$ comme paramètre, il vient

Les trois plans P_λ , Q_λ et R_λ ont une droite en commun si et seulement si $\lambda = 2$, et la droite D_2 admet comme représentation paramétrique $x = -5t$, $y = 3t$, $z = 4t + 1$, pour t réel.

2. Un vecteur directeur de D_2 est donc $\vec{u} = (-5; 3; 4)$. Comme $A(0; 0; 1) \in D_2$, le plan P perpendiculaire à D_2 en A admet pour équation $-5x + 3y + 4(z - 1) = 0$. Ce plan n'est parallèle à aucun des plans P_2 , Q_2 et R_2 puisque des vecteurs normaux à ces plans sont donnés par $(2; 2; 1)$, $(1; 3; -1)$ et $(4; 8; 1)$ respectivement et qu'aucun n'est colinéaire à \vec{u} , et donc les intersections de P avec les trois plans précédents sont des droites perpendiculaires à D_2 et passant par A .

La droite D_2 est une perpendiculaire communes aux droites, appartenant respectivement à P_2 , Q_2 et R_2 , d'équations : $-5x + 3y + 4z - 4 = 2x + 2y + z - 1 = 0$, $-5x + 3y + 4z - 4 = x + 3y - z + 1 = 0$ et $-5x + 3y + 4z - 4 = 4x + 8y - z + 1 = 0$.

Exercice 3

1. Les plans Q_1 et Q_2 ne sont pas parallèles, puisque les vecteurs $n_1(1, 2, -1)$ et $n_2(1, -1, 2)$, qui sont normaux à Q_1 et Q_2 respectivement, ne sont pas colinéaires. Un vecteur directeur de D est donné par $n_1 \wedge n_2(3, -3, -3)$. Comme $(0, 0, 1)$ appartient à Q_1 et Q_2 ,

D est une droite d'équations paramétriques (de paramètre x) : $y = -x$ et $z = 1 - x$.

2. Un point de D s'écrit $(x, -x, 1 - x)$ et un point de Δ s'écrit $(x', 2x' + 1, 0)$ pour x et x' réels. Le vecteur qui relie ces points est alors perpendiculaire aux vecteurs directeurs $(1, -1, -1)$ et $(1, 2, 0)$ de D et Δ respectivement si et seulement si $-3x - x' = x + 5x' + 2 = 0$ i.e. si et seulement si $x = 1/7$ et $x' = -3/7$. Une perpendiculaire commune est donc la droite joignant $(1/7, -1/7, 6/7)$ et $(-3/7, 1/7, 0)$ (et elle existe et est unique puisque ces points sont distincts). La distance entre ces droites est la distance entre deux points, i.e. $2\sqrt{14}/7$. D'où

La perpendiculaire commune à D et Δ est la droite (AB) avec $A(1/7, -1/7, 6/7)$ et $B(-3/7, 1/7, 0)$. De plus $d(D, \Delta) = 2\sqrt{14}/7$.

3. Si $(a, b) = (0, 0)$, $P_{a,b}$ est l'espace entier. Sinon $P_{a,b}$ est un plan. Dans tous les cas $P_{a,b}$ contient D . De plus, si $(a, b) \neq (0, 0)$, la direction normale à $P_{a,b}$ est engendrée par le vecteur $a(1, 2, -1) + b(1, -1, 2)$. Comme les vecteurs $(1, 2, -1)$ et $(1, -1, 2)$ ne sont pas colinéaires, ils forment une base du plan qu'ils engendrent. Par conséquent, pour $(a, b) \neq (0, 0)$ et $(a', b') \neq (0, 0)$, les vecteurs $a(1, 2, -1) + b(1, -1, 2)$ et $a'(1, 2, -1) + b'(1, -1, 2)$ sont colinéaires si et seulement si (a, b) et (a', b') le sont. Si tel est le cas, les plans $P_{a,b}$ et $P_{a',b'}$ sont confondus, et sinon ils ne sont pas parallèles donc a fortiori non confondus.

Si $(a, b) = (0, 0)$, $P_{a,b}$ est l'espace entier. Sinon $P_{a,b}$ est un plan. Dans tous les cas $P_{a,b}$ contient D . De plus $P_{a,b}$ et $P_{a',b'}$ sont confondus si et seulement si (a, b) et (a', b') sont proportionnels, par un facteur de proportionnalité non nul.

4. Pour $(a, b) \neq (0, 0)$, le plan $P_{a,b}$ est perpendiculaire à Q_1 si et seulement si leurs directions normales le sont, ou encore si et seulement si $a(1, 2, -1) + b(1, -1, 2)$ est orthogonal à $(1, 2, -1)$. Ceci s'écrit $6a - 3b = 0$. L'espace entier n'étant pas perpendiculaire à Q_1 , il vient :

$P_{a,b}$ est perpendiculaire à Q_1 si et seulement si (a, b) est un multiple non nul de $(1, 2)$.

5. L'équation de \mathcal{S} peut se récrire $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + z^2 = 4$ et donc

\mathcal{S} est une sphère de centre $(-1, 2, 0)$ et de rayon 2.

6. Une équation de $P_{1,m}$ est $(1 + m)x + (2 - m)y + (2m - 1)z + 1 - 2m = 0$ et donc la distance de A à ce plan est donnée par $|-(1 + m) + 2(2 - m) + 1 - 2m|/\sqrt{(1 + m)^2 + (2 - m)^2 + (2m - 1)^2}$ ou encore $|4 - 5m|/\sqrt{6(m^2 - m + 1)}$.

On a $d(A, P_{1,m}) = |4 - 5m|/\sqrt{6(m^2 - m + 1)}$.

7. Pour $(a, b) = (0, 0)$, $P_{a,b}$ contient \mathcal{S} et ne lui est donc pas tangent. Pour $(a, b) \neq (0, 0)$, le plan $P_{a,b}$ est tangent à la sphère \mathcal{S} si et seulement si $d(A, P_{a,b}) = R$ ou encore si et seulement si $d(A, P_{a,b})^2 = R^2$. Cette dernière condition s'écrit $(4a - 5b)^2 = 24(b^2 - ab + a^2)$, i.e. $b^2 - 16ab - 8a^2 = 0$. Or $b^2 - 16ab - 8a^2 = (b - (8 + 6\sqrt{2})a)(b - (8 - 6\sqrt{2})a)$ et donc

$P_{a,b}$ est tangent à la sphère \mathcal{S} si et seulement si (a, b) est un multiple non nul de $(8 + 6\sqrt{2}, 1)$ ou de $(8 - 6\sqrt{2}, 1)$.

8. On a $d(A, P_{1,1}) = 1/\sqrt{6} < R$ et donc $P_{1,1}$ coupe la sphère \mathcal{S} selon un cercle de centre le projeté orthogonal de A sur $P_{1,1}$ et de rayon $\sqrt{R^2 - d(A, P_{1,1})^2}$, i.e. de rayon $\sqrt{23}/6$. La perpendiculaire à $P_{1,1}$ passant par A admet pour équation paramétrique $(x, y, z) = (-1 + 2t, 2 + t, t)$ et elle coupe donc ce plan en $(-2/3, 13/6, 1/6)$.

L'intersection $P_{1,1} \cap \mathcal{S}$ est un cercle de centre $(-2/3, 13/6, 1/6)$ et de rayon $\sqrt{138}/6$.

Problème

1. (a) L'intersection $\mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2$ contient strictement plus qu'un point si et seulement si $|R_1 - R_2| < d_{1,2} < R_1 + R_2$, et c'est alors un cercle, ou $R_1 - R_2 = d_{1,2} = 0$ est c'est alors une sphère.
- (b) Si $A_1 \neq A_2$, $\Pi_{1,2}$ est un plan, dit plan radical des deux sphères \mathcal{S}_1 et \mathcal{S}_2 . Si $A_1 = A_2$, $\Pi_{1,2}$ est vide si $R_1 \neq R_2$ et est la sphère \mathcal{S}_1 sinon.

La notion de parallélisme n'étant définie que pour les plans et non les sphères ou le vide, on suppose que A_1 est distinct de A_2 et A_3 . Dans ce cas la direction de $\Pi_{1,2}$ est perpendiculaire à (A_1A_2) et celle de $\Pi_{1,3}$ est perpendiculaire à (A_1A_3) .

Les plans $\Pi_{1,2}$ et $\Pi_{1,3}$ sont parallèles si et seulement si A_1 est distinct de A_2 et A_3 et est aligné avec eux.

- (c) Comme A_1, A_2 et A_3 sont distincts et sur une sphère, ils ne sont pas alignés et donc $\Pi_{1,2}$ et $\Pi_{1,3}$ sont des plans non parallèles. Par conséquent $\Pi_{1,2} \cap \Pi_{1,3}$ est une droite. Elle coupe donc la sphère \mathcal{S}_1 en au plus deux points. Comme $\mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2 \cap \mathcal{S}_3 = \mathcal{S}_1 \cap \Pi_{1,2} \cap \Pi_{1,3}$,
- Si A_1, A_2 et A_3 sont distincts et sur une sphère, $\mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2 \cap \mathcal{S}_3$ contient au plus deux points.

2. (a) Soit t un réel fixé. Pour $2 \leq i \leq 4$, les conditions $A_iM = c(t_i - t)$ et $A_1M = c(t_1 - t)$ impliquent $A_iM^2 - c^2(t_i - t)^2 = A_1M^2 - c^2(t_1 - t)^2$. Or, pour $2 \leq i \leq 4$, la condition $A_iM^2 - c^2(t_i - t)^2 = A_1M^2 - c^2(t_1 - t)^2$ est équivalente à $2 \vec{A_iA_1} \cdot \vec{A_1M} = c^2(t_i - t_1)(t_i + t_1 - 2t) - A_1A_i^2$ et cette dernière condition décrit l'appartenance à un plan $P_i(t)$ perpendiculaire à (A_1A_i) et passant par un point $B_i(t)$ dont les coordonnées sont des expressions linéaires en t : $B_i(t) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{c^2(t_i - t_1)(t_i + t_1 - 2t)}{A_1A_i^2} \right) A_1 + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{c^2(t_i - t_1)(t_i + t_1 - 2t)}{A_1A_i^2} \right) A_i$. Autrement dit ce plan a une équation de la forme $\alpha x + \beta y + \gamma z = (\lambda + \mu t)$ avec (α, β, γ) un triplet de réels non tous nuls et (λ, μ) un couple de réels.

Comme $P_i(t)$ est normal à $\vec{A_1A_i}$, $P_2(t)$ et $P_3(t)$ ne sont pas parallèles et leur intersection est dirigée par $\vec{A_1A_2} \wedge \vec{A_1A_3}$ et cette droite est parallèle à $P_4(t)$ si et seulement si $\vec{A_1A_4}$ est normal à ce dernier vecteur, i.e. si et seulement si $\det(\vec{A_1A_2}, \vec{A_1A_3}, \vec{A_1A_4}) = 0$ ou encore si et seulement si (A_1, A_2, A_3, A_4) sont coplanaires.

Si (A_1, A_2, A_3, A_4) ne sont pas coplanaires, $P_2(t) \cap P_3(t) \cap P_4(t)$ est un point M dont les coordonnées s'obtiennent en éliminant x, y et/ou z dans les équations des trois plans. On obtient alors les coordonnées de M sous forme d'un quotient d'une expression linéaire en t par une expression ne dépendant pas de t . Par conséquent les coordonnées de M sont linéaires en t .

Si (A_1, A_2, A_3, A_4) sont coplanaires, $P_2(t) \cap P_3(t) \cap P_4(t)$ est soit une droite, soit vide. Quand ce n'est pas vide, une des coordonnées est arbitraire et les autres en dépendent. Elles sont alors des expressions linéaires en t et en cette coordonnée.

Soit M un point dont les coordonnées sont linéaires en t , la condition $A_i M = c(t_i - t)$ implique $A_i M^2 = c^2(t_i - t)^2$, ce qui est une équation de degré au plus 2 en t .

Les coordonnées de M peuvent s'exprimer linéairement en fonction de t et que t vérifie une équation du second degré.

- (b) Les équations des plans précédents sont, sous les conditions de l'énoncé :

$$\begin{aligned} -2.02x + 4.10y - 4.12z &= -3.82206225 + 0.077315t \\ -0.16x + 2.34y - 2.28z &= 3.44455075 - 0.0561086t \\ -2.18x + 2.16y &= 0.0243 \end{aligned}$$

En considérant 4.12 fois la seconde équation moins 2.28 fois la première, on voit que le système précédent est équivalent à

$$\begin{aligned} -2.02x + 4.10y - 4.12z &= -3.82206225 + 0.077315t \\ -2.18x + 2.16y &= 0.0243 \\ 3.9464x + 0.2928y &= 22.90585102 - 0.407445632t \end{aligned}$$

et donc en considérant 3.9464 fois la seconde équation plus 2.18 fois la dernière, on obtient une équivalence avec

$$\begin{aligned} -2.02x + 4.10y - 4.12z &= -3.82206225 + 0.077315t \\ -2.18x + 2.16y &= 0.0243 \\ 9.162528y &= 50.03065275 - 0.8882314779t \end{aligned}$$

et on en déduit $y \simeq 5.46 - 0.0969t$, puis $x \simeq 5.40 - 0.0961t$ et $z \simeq 3.71 - 0.0681t$.

En remplaçant dans $A_1 M^2 = c^2(t_1 - t)^2$, il vient

t est solution de l'équation $44.436 - 1.936t + 0.021t^2 \simeq 0$.

- (c) On a par ailleurs $x^2 + y^2 + z^2 \simeq 72.8 - 2.60t + 0.0233t^2$. Comme $72.8 - 2.60t + 0.0233t^2 \simeq 1.11(44.436 - 1.936t + 0.021t^2) + 23.7 - 0.463t$, si t est solution de l'équation $44.436 - 1.936t + 0.021t^2 \simeq 0$, on a $x^2 + y^2 + z^2 \simeq 23.7 - 0.463t$ et donc si M est sur la sphère unité, $t \simeq 49.0$. Comme la demi-somme des racines de l'équation $44.436 - 1.936t + 0.021t^2 = 0$ est $1.936/0.042$, soit environ 46, on choisit la plus grande des solutions. Comme 49.0 est supérieur à t_1 , t_2 , t_3 et t_4 , on a équivalence entre les conditions $A_i M = c(t_i - t)$ et ces conditions mises au carré. On obtient donc, en substituant $t = 49$ dans les valeurs de x , y et z trouvées : $M \simeq (0.69, 0.71, 0.38)$. Ces coordonnées ne sont pas vraiment sur la sphère unité, on constate une erreur de l'ordre de 10%.

Si M est approximativement sur la sphère unité, il faut choisir pour t la plus grande des deux solutions de l'équation du second degré, soit $t \simeq 49.0$ et alors les coordonnées de M sont approximativement $(0.69, 0.71, 0.38)$.

3. (a) Comme on connaît d_i précisément, on connaît r_i précisément et on a donc $A_i M = r_i$, i.e. M est sur une sphère de centre A_i de rayon r_i . D'après la question 1, l'intersection de ces sphères est constituée d'au plus deux points. Le fait d'être proche de la surface de la Terre permet de savoir lequel des deux points correspond au récepteur.

Les données transmises par trois satellites suffisent à déterminer la position du récepteur.

- (b) Soit t le décalage entre l'horloge du récepteur et celle des satellites. La différence entre les durées réelle et mesurée est donc t . La question 2 montre que les données de quatre satellites permettent de mesurer t ainsi que la position du récepteur, une fois encore en supposant qu'on est proche de la surface de la Terre. Si on connaît de plus l'altitude (avec un altimètre ou si on est à la surface de la mer par exemple), alors on a une quatrième donnée et on a donc deux positions possibles pour le récepteur. Une approximation de cette position suffit donc à connaître la position précise.

Il faut quatre ensembles de données satellitaires pour déterminer la position du récepteur, sauf si l'on connaît son altitude auquel cas trois suffisent.

- (c) Si deux sphères se coupent avec un angle très petit, une imprécision sur les distances peut donner un très fort écart entre la position réelle et la position mesurée. En effet deux points M_1 et M_2 proches du point d'intersection M de \mathcal{S}_1 et de \mathcal{S}_2 , respectivement sur \mathcal{S}_1 et \mathcal{S}_2 , sont tels que $\overrightarrow{MM_1}$ fait un angle très petit avec $\overrightarrow{MM_2}$ et donc la distance M_1M_2 est très petite (d'après la formule d'Al-Kashi par exemple). Avec une imprécision, on peut donc penser qu'on a $M_1 = M_2$ et donc choisir M_1 au lieu de M comme point d'intersection des sphères et donc comme position du récepteur.

On a intérêt à choisir les quatre satellites de sorte que l'angle entre les plans tangents en M aux sphères $\mathcal{S}(A_i; A_iM)$ soit le plus grand possible.

- (d) Le déterminant considéré est le volume du parallélépipède issu de A_4 et porté par $\overrightarrow{A_4A_1}$, $\overrightarrow{A_4A_2}$ et $\overrightarrow{A_4A_3}$. Ce volume est d'autant plus grand que les angles entre les vecteurs considérés sont grands (on prend des angles de droites, donc entre 0 et $\pi/2$). Or ces vecteurs sont des vecteurs normaux aux plans considérés en question 2, ce volume est donc d'autant plus grand que les angles entre les plans sont importants. Pour la même raison que précédemment, l'importance de ces angles permet une meilleure précision dans le calcul de leur intersection.

On a intérêt à choisir $\begin{vmatrix} a_4 - a_1 & a_4 - a_2 & a_4 - a_3 \\ b_4 - b_1 & b_4 - b_2 & b_4 - b_3 \\ c_4 - c_1 & c_4 - c_2 & c_4 - c_3 \end{vmatrix}$ le plus grand possible.

4. (a) De par la définition donnée par l'énoncé le produit vectoriel considéré est le vecteur

$$(\rho^2 \cos(\theta) \cos^2(\varphi), \rho^2 \sin(\theta) \cos^2(\varphi), \rho^2 \sin(\varphi) \cos(\varphi)),$$

dont la norme est $\rho^2 |\cos(\varphi)|$.

L'élément de surface en un point de la sphère est $\rho^2 |\cos(\varphi)|$.

- (b) Le vecteur u' est donné par $(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \rho \sin(\varphi))$ et donc on effectue le produit vectoriel de $(-\rho \sin(\theta), \rho \cos(\theta), 0)$ avec $(0, 0, \rho \cos(\varphi))$, soit $(\rho^2 \cos(\theta) \cos(\varphi), \rho^2 \sin(\theta) \cos(\varphi), 0)$. Et donc

L'élément de surface en un point du cylindre est $\rho^2 |\cos(\varphi)|$.

- (c) La projection de Lambert ne préserve pas la longueur des *parallèles* (les cercles à latitude constante). Le rayon d'un parallèle de latitude φ est $\rho \cos(\varphi)$. En le représentant par un segment de longueur ρ , on l'agrandit donc d'un facteur $1/\cos(\varphi)$.

Lorsque φ s'accroît, la coordonnée en $z = \rho \ln(\tan((\varphi + \pi/2)/2))$ sur le cylindre varie et son taux d'accroissement est $dz/d\varphi = \rho/\cos(\varphi)$.

Soit maintenant un petit carré à la latitude φ . Son côté est, disons, h . Sa hauteur est aussi $\rho\Delta\varphi$. Supposons que l'on représente la latitude φ par une horizontale, sur le cylindre, à hauteur z , le petit carré est transformé en un trapèze. Le côté correspondant à la latitude φ est de longueur $h/\cos(\varphi)$, i.e. $\rho\Delta\varphi/\cos(\varphi)$. Celui correspondant à la latitude $\varphi + \Delta\varphi$ est de longueur $h/\cos(\varphi + \Delta\varphi)$, i.e. à peu près $\rho\Delta\varphi/\cos(\varphi)$. On a donc affaire approximativement à un rectangle. Pour que ce soit un carré, il faut que l'accroissement de z soit aussi $\rho\Delta\varphi/\cos(\varphi)$, i.e. $\Delta z/\Delta\varphi = \rho/\cos(\varphi)$.

La projection de Mercator est celle qui transforme les petits carrés à la surface de la Terre en des petits carrés à la surface du cylindre.

- (d) i. On a $v'_1 = (-\rho\theta' \sin(\theta) \cos(\varphi) - \rho\varphi' \cos(\theta) \sin(\varphi), \rho\theta' \cos(\theta) \cos(\varphi) - \rho\varphi' \sin(\theta) \sin(\varphi))$ et donc $v'_1(0) = \rho(-\cos(\alpha) \sin(\theta_0) \cos(\varphi_0) - \sin(\alpha) \cos(\theta_0) \sin(\varphi_0), \cos(\alpha) \cos(\theta_0) \cos(\varphi_0) - \sin(\alpha) \sin(\theta_0) \sin(\varphi_0), \sin(\alpha) \cos(\varphi_0))$. La valeur de $w'_1(0)$ est obtenue en changeant α en β .

$$\text{On a } v'_1(0) = \rho \begin{pmatrix} -\cos(\alpha) \sin(\theta_0) \cos(\varphi_0) - \sin(\alpha) \cos(\theta_0) \sin(\varphi_0) \\ \cos(\alpha) \cos(\theta_0) \cos(\varphi_0) - \sin(\alpha) \sin(\theta_0) \sin(\varphi_0) \\ \sin(\alpha) \cos(\varphi_0) \end{pmatrix} \text{ et}$$

$$w'_1(0) = \rho \begin{pmatrix} -\cos(\beta) \sin(\theta_0) \cos(\varphi_0) - \sin(\beta) \cos(\theta_0) \sin(\varphi_0) \\ \cos(\beta) \cos(\theta_0) \cos(\varphi_0) - \sin(\beta) \sin(\theta_0) \sin(\varphi_0) \\ \sin(\beta) \cos(\varphi_0) \end{pmatrix}.$$

- ii. On a $v'_2 = \rho(-\theta' \sin(\theta), \theta' \cos(\theta), \phi'/\cos(\varphi))$ et la valeur de $w'_1(0)$ est obtenue en changeant α en β .

$$\text{On a } v'_2(0) = \rho(-\cos(\alpha) \sin(\theta_0), \cos(\alpha) \cos(\theta_0), \sin(\alpha)/\cos(\varphi_0)) \text{ et}$$

$$w'_2(0) = \rho(-\cos(\beta) \sin(\theta_0), \cos(\beta) \cos(\theta_0), \sin(\beta)/\cos(\varphi_0)).$$

- iii. Le cosinus d'un angle est donné par le quotient du produit scalaire entre deux vecteurs formant l'angle et le produit de leurs normes. Ici un calcul direct donne $v'_1(0) \cdot w'_1(0) = \rho^2(\cos^2(\varphi_0) \cos(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\alpha) \sin(\beta))$ et $v'_2(0) \cdot w'_2(0) = \rho^2(\cos(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\alpha) \sin(\beta)/\cos^2(\varphi_0))$. Les normes sont obtenues en faisant $\alpha = \beta$ dans les formules précédentes. Par conséquent le cosinus des angles entre $v'_1(0)$ et $w'_1(0)$, tout comme entre $v'_2(0)$ et $w'_2(0)$, est égal à

$$\frac{\cos^2(\varphi_0) \cos(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\alpha) \sin(\beta)}{\sqrt{\cos^2(\varphi_0) \cos(\alpha)^2 + \sin(\alpha)^2} \sqrt{\cos^2(\varphi_0) \cos(\beta)^2 + \sin(\beta)^2}}.$$

- (e) Prenons trois points sur l'équateur, équidistants. Ils seront donc représentés par un triangle équilatéral sur la carte. Le pôle nord est équidistant des trois points, il sera donc sur les trois médiatrices du triangle sur la carte et donc au centre de gravité du triangle. Mais le pôle sud aussi est équidistant des trois points et il sera donc représenté par le même point sur la carte.


Une telle carte est donc impossible à réaliser.

Pour des compléments, voir par exemple : <http://images.math.cnrs.fr/Representer-les-mondes.html>.

Question subsidiaire :



Galileo Galilée



Hermann G. Grassmann



Johann H.Lambert



Gerard Kremer - Mercator