

On peut admettre des résultats des questions précédentes en le signalant. Si vous détectez ce que vous pensez être une erreur d'énoncé, signalez-le et indiquez ce que vous avez été amené(e) à faire.

Enfin, les résultats doivent être encadrés ou soulignés. Merci de soigner la rédaction.

Le barème tient compte du soin (respect des consignes, propreté et qualité de la relecture) et de la rigueur (écriture mathématique, définition des objets, vérification des hypothèses etc.).

LES CALCULATRICES SONT INTERDITES

Exercice (ENAC) - 1/2 point par question

Répondre au QCM suivant en indiquant une réponse parmi les trois suivantes : *Pas de réponse correcte, Seule la réponse (x) est correcte, Les réponses (x) et (y) sont correctes.* Il est inutile de justifier votre réponse, une réponse partielle est jugée incorrecte (s'il y a plusieurs bonnes réponses, en indiquer seulement une est considéré comme erroné).

L'espace \mathbf{R}^3 est rapporté à sa base canonique \mathcal{B} . Soit f l'endomorphisme de \mathbf{R}^3 qui à tout triplet (x, y, z) de réels associe le triplet $(x + 3z, 0, y - 2z)$.

1. La matrice A de f par rapport à la base \mathcal{B} s'écrit :

$$(a) \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} . (b) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix} . (c) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} . (d) \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} .$$

2. L'endomorphisme f est de rang :

- (a) 3 car A a trois colonnes non nulles
- (b) au plus 2 car A a une ligne nulle
- (c) 2 car le rang est égal au nombre de lignes non nulles de l'une des représentations matricielles de l'endomorphisme
- (d) 3 car f est défini sur un espace vectoriel de dimension 3

3. Le noyau de l'endomorphisme f a pour dimension :

- (a) 0 car $\text{Ker}(f) = \{0\}$
- (b) 1 car $\dim(\text{Ker}(f)) = \dim(\mathbf{R}^3) - \text{rg}(f)$
- (c) 2 car la matrice A de f a deux colonnes non nulles linéairement indépendantes
- (d) 3 car f est défini sur un espace vectoriel de dimension 3

4. Les sous-espaces image et noyau de f vérifient

- (a) $\text{Ker}(f) = \text{Im}(f)$
- (b) $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont en somme directe car $\dim(\mathbf{R}^3) = \dim(\text{Ker}(f)) + \text{rg}(f)$
- (c) $\text{Ker}(f)$ est un sous-espace vectoriel de $\text{Im}(f)$
- (d) $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de $\text{Ker}(f)$

PREMIER PROBLÈME (Petites Mines)

Le symbole \mathbf{R} désigne l'ensemble des nombres réels.

On considère n et p deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2.

On notera $M_n(\mathbf{R})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels, $GL_n(\mathbf{R})$ l'ensemble des matrices inversibles de $M_n(\mathbf{R})$, et $D_n(\mathbf{R})$ l'ensemble des matrices diagonales de $M_n(\mathbf{R})$.

Le symbole I_n désigne la matrice identité de $M_n(\mathbf{R})$, c'est-à-dire la matrice diagonale d'ordre n dont les termes diagonaux sont tous égaux à 1.

Le but de ce problème est l'étude des ensembles

$$R_n(p) = \{A \in M_n(\mathbf{R}) \mid A^p = I_n\} .$$

Dans la deuxième et la troisième partie, E désigne un \mathbf{R} -espace vectoriel de dimension 2 muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1; e_2)$, et Id_E désigne l'identité de E .

Partie I. Généralités

1. L'ensemble $R_n(p)$ est-il un sous-espace vectoriel de $M_n(\mathbf{R})$?
2. Soit A dans $R_n(p)$. Montrer que A appartient à $GL_n(\mathbf{R})$ et qu'on a $A^{-1} \in R_n(p)$.
3. Soit A dans $R_n(p)$ et P dans $GL_n(\mathbf{R})$. Montrer $P^{-1}AP \in R_n(p)$.
4. Montrer que $R_n(p) \cap D_n(\mathbf{R})$ est un ensemble fini dont on déterminera le cardinal.

Partie II. Étude de $R_2(2)$

1. Soit A un élément de $R_2(2)$ tel que $A \neq I_2$ et $A \neq -I_2$, et soit u l'endomorphisme de E dont la matrice dans la base \mathcal{B} est A .
 - (a) Montrer $\text{Ker}(u - Id_E) \oplus \text{Ker}(u + Id_E) = E$.
 - (b) En déduire qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.
 - (c) Montrer qu'il existe quatre réels a, b, c et d tels que $ad - bc \neq 0$ et

$$A = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} ad + bc & -2ab \\ 2cd & -ad - bc \end{pmatrix} .$$

2. Montrer que $R_2(2)$ muni de la multiplication des matrices n'est pas un groupe. Interpréter géométriquement ce résultat.

Partie III. Étude de $R_2(3)$

Dans toute la suite du problème, M désigne un élément de $R_2(3)$, et v l'endomorphisme de E dont la matrice dans \mathcal{B} est M . On considère les sous-espaces vectoriels de E :

$$F = \text{Ker}(v - Id_E) \quad \text{et} \quad G = \text{Ker}(v^2 + v + Id_E)$$

où $v^2 = v \circ v$.

1. (a) Montrer $F \cap G = \{0\}$.
 (b) Soit x dans E . Montrer $\frac{1}{3}(x + v(x) + v^2(x)) \in F$ et $\frac{1}{3}(2x - v(x) - v^2(x)) \in G$.
 (c) En déduire $E = F \oplus G$.
2. Que peut-on dire de M si F est de dimension 2?
3. Le but de cette question est de montrer à l'aide d'un raisonnement par l'absurde que F n'est pas de dimension 1. On suppose donc que F est de dimension 1.
 - (a) Montrer qu'il existe une base \mathcal{G} de E , avec $\mathcal{G} = (g_1; g_2)$, telle que F soit la droite vectorielle engendrée par g_1 et G soit la droite vectorielle engendrée par g_2 .
 - (b) En considérant le vecteur $v^2(g_2) + v(g_2) + g_2$, obtenir une contradiction.
4. On suppose dans cette question que F est de dimension 0.
 - (a) Montrer que $(e_1; v(e_1))$ est une base de E .
 - (b) En déduire qu'il existe un réel a et un réel non nul b tels que

$$M = \frac{1}{b} \begin{pmatrix} ab & -1 - a - a^2 \\ b^2 & -ab - b \end{pmatrix}.$$

SECOND PROBLÈME (Petites Mines)

Partie I.

Notons E le \mathbf{R} -espace vectoriel des applications de \mathbf{R} dans \mathbf{R} de classe C^∞ et D l'application définie sur E qui à f associe f' . Soit f_1, f_2 et f_3 les éléments de E définis ainsi (on ne demande pas de vérifier que ce sont bien des éléments de E) :

$$f_1(t) = e^t, \quad f_2(t) = e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{3}t}{2}\right) \quad \text{et} \quad f_3(t) = e^{-t/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}t}{2}\right).$$

Nous noterons $\mathcal{B} = (f_1, f_2, f_3)$ et G le sous-espace vectoriel de E engendré par \mathcal{B} .

1. Montrer que D est un endomorphisme de E .
2. Déterminez le noyau et l'image de D .
3. Nous allons montrer que \mathcal{B} est une famille libre de vecteurs de E . Soit a, b et c des réels tels que $af_1 + bf_2 + cf_3$ soit la fonction nulle. En choisissant (adroitement) trois valeurs de t , obtenir un système de trois équations aux trois inconnues a, b et c , le résoudre et conclure.
4. En déduire que la famille \mathcal{B} est une base de G et donner la dimension de ce sous-espace.
5. Montrez que G est stable par D , i.e. $D(G) \subset G$.

Nous noterons \widehat{D} l'endomorphisme de G induit par D , i.e. l'application de G dans lui-même définie par $\widehat{D}(f) = D(f)$.

6. Déterminez la matrice M de \widehat{D} dans la base \mathcal{B} .
7. Calculez M^3 .
8. Montrez que M est inversible, et explicitez son inverse M^{-1} .
9. Montrez que \widehat{D} est un automorphisme de G .
10. Exprimez $(\widehat{D})^{-1}$ en fonction de \widehat{D} .

Partie II.

Nous nous intéressons dans cette partie à l'équation différentielle $y''' = y$, que nous noterons (\mathcal{E}) . Une solution sur \mathbf{R} de (\mathcal{E}) est une fonction f définie et trois fois dérivable sur \mathbf{R} , vérifiant $\forall t \in \mathbf{R}, f'''(t) = f(t)$. Nous notons T l'application définie par $T = D^3 - Id$, où Id est l'identité de E , et $D^3 = D \circ D \circ D$. Le noyau de T est donc l'ensemble des solutions de (\mathcal{E}) .

1. Montrez que toute solution f de (\mathcal{E}) est de classe C^∞ .
2. Montrez que la fonction nulle est la seule solution polynomiale de (\mathcal{E}) .
3. Montrez que G est contenu dans le noyau de T .
Nous allons établir l'inclusion inverse; ainsi G sera exactement l'ensemble des solutions de (\mathcal{E}) . Soit f une solution de (\mathcal{E}) ; nous noterons $g = f'' + f' + f$.
4. Montrez que g est solution de l'équation différentielle $y' = y$.
5. Décrivez rapidement l'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' - y = 0$.
6. Résolvez l'équation différentielle $y'' + y' + y = 0$; vous donnerez une base de l'espace des solutions.
7. Soit λ un réel. Décrivez l'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y'' + y' + y = \lambda e^t$.
8. Et maintenant, concluez!

Question subsidiaire : qui sont ces quatre personnes ?



Exercice – Algèbre linéaire (ENAC 2006)

1. (c). On a $f(e_1) = e_1$, $f(e_2) = e_3$ et $f(e_3) = 3e_1 - 2e_3$. La matrice A de f par rapport à la base \mathcal{B} s'écrit donc :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

2. (b) et (c). L'endomorphisme f est de rang au plus 2 car A a une ligne nulle et en fait de rang 2 car le rang est égal au nombre de lignes non nulles de l'une des représentations matricielles de l'endomorphisme, à savoir sous forme de matrice échelonnée et une telle représentation s'obtient en échangeant la seconde et la troisième ligne de A .
3. (b). Le noyau de l'endomorphisme f a pour dimension 1 car $\dim(\text{Ker}(f)) = \dim(\mathbf{R}^3) - \text{rg}(f)$. Notez qu'on ne peut déduire cela que parce que la réponse 2(c) est correcte!
4. Aucune bonne réponse. Les sous-espaces image et noyau sont effectivement en somme directe mais pas en raison du théorème du rang, plutôt parce que leur intersection est réduite à $\{0\}$. On a $\text{Ker}(f) = \text{Vect}(e_3 + 2e_2 - 3e_1)$ et $\text{Im}(f) = \text{Vect}(e_1, e_3)$.

PREMIER PROBLÈME (Petites Mines 1998)**Partie I. Généralités**

1. Comme il ne contient pas la matrice nulle,

l'ensemble $R_n(p)$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $M_n(\mathbf{R})$.

2. Soit A dans $R_n(p)$ et $B = A^{p-1}$. On a $AB = BA = A^p = I_n$ et donc A est inversible, d'inverse B . On a alors $B^p = A^{p(p-1)} = (A^p)^{p-1} = I_n^{p-1} = I_n$.

Si A appartient à $R_n(p)$, alors A appartient à $GL_n(\mathbf{R})$ et on a $A^{-1} \in R_n(p)$.

3. Soit A dans $R_n(p)$ et P dans $GL_n(\mathbf{R})$. On a

$$(P^{-1}AP)^p = P^{-1}A(PP^{-1})A \dots (PP^{-1})AP = P^{-1}A^pP = P^{-1}I_nP = P^{-1}P = I_n$$

et donc $P^{-1}AP \in R_n(p)$.

Soit A dans $R_n(p)$ et P dans $GL_n(\mathbf{R})$, on a $P^{-1}AP \in R_n(p)$.

4. Soit A dans $D_n(\mathbf{R})$. On note $A = \text{diag}(a_1, \dots, a_n)$ et on a donc $A^p = \text{diag}(a_1^p, \dots, a_n^p)$, de sorte qu'on a $A \in R_n(p)$ si et seulement si a_1, \dots, a_n appartiennent chacun au groupe $U_p(\mathbf{C})$ des racines p -ème de l'unité. Si p est pair les seuls réels appartenant à $U_p(\mathbf{C})$ sont 1 et -1 , tandis que si p est impair, seul 1 est une racine p -ème réelle de l'unité.

L'ensemble $R_n(p) \cap D_n(\mathbf{R})$ est fini de cardinal 2^n si p est pair, et réduit au singleton $\{I_n\}$ si p est impair.

Partie II. Étude de $R_2(2)$

1. (a) Puisque $u^2 = Id$, u est une symétrie, il en résulte :

$$\boxed{\text{Ker}(u - Id_E) \oplus \text{Ker}(u + Id_E) = E.}$$

- (b) Puisque $u \neq Id_E$, $\text{Ker}(u - Id_E) \neq E$ et, de même, puisque $u \neq -Id_E$, $\text{Ker}(u + Id_E) \neq E$. La dimension de ces espaces est donc de 0 ou 1, mais leur somme vaut 2 et donc $\text{Ker}(u - Id_E)$ et $\text{Ker}(u + Id_E)$ sont des droites. Soit (e) et (f) des bases de $\text{Ker}(u - Id_E)$ et $\text{Ker}(u + Id_E)$ respectivement, (e, f) est alors une base de E et

$$\boxed{\text{dans cette base, la matrice de } u \text{ est } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

- (c) Soit P la matrice de passage de la base canonique à (e, f) . C'est une matrice inversible et on peut poser

$$P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

avec $\det(P) = ad - bc \neq 0$. On a alors

$$P^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

et

$$A = P \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} ad + bc & -2ab \\ 2cd & -ad - bc \end{pmatrix}.$$

$\boxed{\text{Il existe quatre réels } a, b, c \text{ et } d \text{ tels que } ad - bc \neq 0 \text{ et}}$

$$\boxed{A = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} ad + bc & -2ab \\ 2cd & -ad - bc \end{pmatrix}.$$

2. Soit u la symétrie donnée par la matrice A dans la base canonique avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

et v celle donnée par B avec $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. On a

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

et $(AB)^2 = -I_2$, par conséquent $AB \notin R_2(2)$.

$\boxed{\text{L'ensemble } R_2(2) \text{ muni de la multiplication des matrices n'est pas un groupe. Géométriquement, un produit de deux symétries n'en est pas une : c'est une rotation. Les seules rotations de carré identité sont } -Id_E \text{ et } Id_E \text{ et donc, en général, le produit de deux symétries n'est pas de carré identité.}}$

Partie III. Étude de $R_2(3)$

1. (a) Soit x dans $F \cap G$. On a $v(x) = x$ et $v(x) = -x$, donc $x = -x$ et ainsi $x = 0$.

$$F \cap G = \{0\}.$$

- (b) Soit x dans E . Posons $y = \frac{1}{3}(x + v(x) + v^2(x))$ et $z = \frac{1}{3}(2x - v(x) - v^2(x))$. Puisque $v^3 = Id_E$ et donc $v^4 = v$, on a

$$v(y) = \frac{1}{3}(v(x) + v^2(x) + v^3(x)) = \frac{1}{3}(v(x) + v^2(x) + x) = y$$

et

$$\begin{aligned} z + v(z) + v^2(z) &= \frac{1}{3}(2x - v(x) - v^2(x)) + \frac{1}{3}(2v(x) - v^2(x) - v^3(x)) \\ &\quad + \frac{1}{3}(2v^2(x) - v^3(x) - v^4(x)) \\ &= \frac{1}{3}(2x - v(x) - v^2(x)) + \frac{1}{3}(2v(x) - v^2(x) - x) \\ &\quad + \frac{1}{3}(2v^2(x) - x - v(x)) \\ &= z \end{aligned}$$

et donc

$$\frac{1}{3}(x + v(x) + v^2(x)) \in F \text{ et } \frac{1}{3}(2x - v(x) - v^2(x)) \in G.$$

- (c) Avec les notations précédents, on a $x = y + z$ et il en résulte $E = F + G$. D'après la question 1(a), cette somme est directe et il vient

$$E = F \oplus G.$$

2. Si F est de dimension 2, $v = Id_E$ et donc $M = I_2$.

$$\text{Si } F \text{ est de dimension 2, } M = I_2.$$

3. (a) Si F est de dimension 1, alors G aussi puisque $E = F \oplus G$ et E est de dimension 2. Soit (g_1) une base de F et (g_2) une base de G , alors $\mathcal{G} = (g_1; g_2)$ est une base de E .

Il existe une base \mathcal{G} de E , avec $\mathcal{G} = (g_1; g_2)$, telle que F soit la droite vectorielle engendrée par g_1 et G soit la droite vectorielle engendrée par g_2 .

- (b) Soit $x = v^2(g_2) + v(g_2) + g_2$. D'après 1(b), on a $x \in F$. Décomposons maintenant $v(g_2)$ dans la base \mathcal{G} : $v(g_2) = ag_1 + bg_2$. On a alors $v^2(g_2) = av(g_1) + bv(g_2) = (a + ab)g_1 + b^2g_2$. Il vient $x = (2a + ab)g_1 + (1 + b + b^2)g_2$ et donc, puisque $x \in F$, $1 + b + b^2 = 0$. Or, puisque b est réel, $1 + b + b^2$ ne saurait être nul car il n'y a pas de racine cubique primitive de l'unité dans \mathbf{R} .

On obtient donc une contradiction.

4. (a) Puisque F est réduit à $\{0\}$, on a $E = G$. Comme e_1 n'est pas nul, $(e_1, v(e_1))$ est liée si et seulement si il existe λ réel tel que $v(e_1) = \lambda e_1$. Si tel était le cas, on aurait $1 + v(e_1) + v^2(e_1) = (1 + \lambda + \lambda^2)e_1$ et ce dernier vecteur appartiendrait à F , d'après 1(b), et donc serait nul. Or, puisque λ est réel, $1 + \lambda + \lambda^2$ ne saurait être nul et e_1 non plus. Cette contradiction assure que la famille $(e_1; v(e_1))$ est libre. Par cardinalité,

$(e_1; v(e_1))$ est une base de E .

- (b) Dans la base $(e_1; v(e_1))$, la matrice de v est

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

puisque $v(e_1) = v(e_1)$ et $v(v(e_1)) = v^2(e_1) = -e_1 - v(e_1)$ car $(Id_E + v + v^2)(e_1) = 0$. Soit P la matrice de passage de la base canonique à $(e_1; v(e_1))$, on peut l'écrire

$$P = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

avec $a \in \mathbf{R}$ et $b \in \mathbf{R}^*$. On a alors

$$P^{-1} = \frac{1}{b} \begin{pmatrix} b & -a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et

$$A = P \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} P^{-1} = \frac{1}{b} \begin{pmatrix} ab & -1 - a - a^2 \\ b^2 & -ab - b \end{pmatrix}.$$

Il existe un réel a et un réel non nul b tels que $M = \frac{1}{b} \begin{pmatrix} ab & -1 - a - a^2 \\ b^2 & -ab - b \end{pmatrix}$.

SECOND PROBLÈME (Petites Mines 2003)

Partie I.

L'énoncé comportait une typographie. Il fallait lire $E = C^\infty(\mathbf{R}, \mathbf{R})$.

1. Soit f un élément de E , f est donc dérivable et sa dérivée est de classe C^∞ . Il en résulte que D est une application de E dans E . Par linéarité de la dérivation, c'est une application linéaire. Autrement dit,

D est un endomorphisme de E .

2. Une fonction est de dérivée nulle si et seulement si elle est constante. Soit maintenant f dans E . Puisque f est continue, elle est intégrable et elle admet une primitive sur \mathbf{R} . Soit F une telle primitive. On a donc $D(F) = f$ et ainsi D est surjective.

On a $\text{Ker}(D) = \mathbf{R}1_R$, où 1_R est la fonction constante égale à 1, et $\text{Im}(D) = E$.

3. Soit a , b et c des réels tels que $af_1 + bf_2 + cf_3$ est la fonction nulle. On évalue cette combinaison linéaire en 0 , $\pi/\sqrt{3}$ et $2\pi/\sqrt{3}$. On obtient ainsi un système de trois équations aux trois inconnues a , b et c :

$$\begin{cases} a & +c & = 0 \\ ae^{\pi/\sqrt{3}} & +be^{-\pi/2\sqrt{3}} & = 0 \\ ae^{2\pi/\sqrt{3}} & -ce^{\pi/\sqrt{3}} & = 0 \end{cases}$$

D'après la première équation, a et c sont de signes opposés. D'après la dernière, ils sont de même signe. Et donc ils sont tous deux nuls. La seconde ligne montre alors que b est également nul. La seule combinaison linéaire annulant la famille \mathcal{B} est donc la combinaison triviale et, par suite,

la famille \mathcal{B} est libre.

4. Par définition de G , \mathcal{B} en est une famille génératrice. C'en est donc une base, et donc

la famille \mathcal{B} est une base de G et $\dim(G) = 3$.

5. Par dérivation d'un produit, il vient $D(f_1) = f_1$, $D(f_2) = -\frac{1}{2}f_2 + \frac{\sqrt{3}}{2}f_3$ et $D(f_3) = -\frac{1}{2}f_3 - \frac{\sqrt{3}}{2}f_2$. Par conséquent l'image de \mathcal{B} par D est incluse dans G et donc, par linéarité de D ,

G est stable par D .

6. D'après les calculs précédents la matrice M de \widehat{D} dans la base \mathcal{B} est donnée par

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

7. D'après ce qui précède M est une matrice diagonale par blocs. Le premier bloc est un bloc $(1, 1)$ égal à 1 et le second est un bloc $(2, 2)$ égal à la matrice d'une rotation d'angle $2\pi/3$. Il en résulte que M^3 est la matrice diagonale par blocs dont les blocs diagonaux sont les cubes de ceux de M , et donc 1 et la matrice d'une rotation d'angle 2π , i.e. I_2 . En d'autres termes :

on a $M^3 = I_3$.

8. On a $M.M^2 = M^2.M = I_3$ et donc

M est inversible et $M^{-1} = M^2$.

9. Puisque M est inversible et est la matrice associée à \widehat{D} dans une base de G ,

\widehat{D} est un automorphisme de G .

10. Il résulte de (8) qu'on a

$(\widehat{D})^{-1} = \widehat{D}^2$.

Partie II.

1. Puisque $f''' = f$ et f est trois fois dérivable, f''' l'est aussi et f est six fois dérivable. Par une récurrence immédiate, f est donc $3n$ fois dérivable pour tout entier naturel n .

Toute solution de (\mathcal{E}) est de classe C^∞ .

2. Si f est une fonction polynomiale, une de ses dérivées est nulle. Quitte à dériver une ou deux fois de plus, il existe donc un entier naturel n tel que $f^{(3n)} = 0$. Mais alors, si f est solution de (\mathcal{E}) , on a aussi $f^{(3n)} = f$ et donc $f = 0$.

La fonction nulle est la seule solution polynomiale de (\mathcal{E}) .

3. Par définition, on a $T|_G = D|_G^3 - Id_G = \widehat{D}^3 - Id_G = 0$, d'après I.10, et donc

G est contenu dans le noyau de T .

4. Puisque f est de classe C^∞ et que $C^\infty(\mathbf{R}, \mathbf{R})$ est une algèbre, g est de classe C^∞ . Par ailleurs $g' = (f'' + f' + f)' = f''' + f'' + f' = g$ puisque f est solution de (\mathcal{E}) .

La fonction g est solution de l'équation différentielle $y' = y$.

5. L'équation $y' = y$ est une équation différentielle linéaire à coefficients constants et son polynôme caractéristique est $X - 1$. Ses solutions sont donc les multiples de l'exponentielle.

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' - y = 0$ est $\mathbf{R}f_1$.

6. L'équation différentielle $y'' + y' + y = 0$ est une équation différentielle linéaire à coefficients constants et son polynôme caractéristique est $X^2 + X + 1$, dont les racines sont $(-1 + i\sqrt{3})/2$ et $(-1 - i\sqrt{3})/2$. Par conséquent ses deux solutions fondamentales sont f_2 et f_3 .

L'espace des solutions de l'équation différentielle $y'' + y' + y = 0$ admet pour base (f_2, f_3) .

7. La fonction $\frac{\lambda}{3}f_1$ est solution particulière de l'équation différentielle $y'' + y' + y = \lambda e^t$ puisqu'elle vérifie $y'' + y' + y = 3y$. D'après le principe de superposition, on déduit de (6)

l'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y'' + y' + y = \lambda e^t$ est l'ensemble des fonctions de la forme $\frac{\lambda}{3}f_1 + \alpha f_2 + \beta f_3$, avec $(\alpha, \beta) \in \mathbf{R}^2$.

8. Soit f une solution de (\mathcal{E}) et $g = f'' + f' + f$. D'après (4) et (5), g appartient à $\mathbf{R}f_1$. Donc, d'après (7), f appartient à G , et donc $\text{Ker}(T) \subset G$. D'après (3), il en résulte

$\text{Ker}(T) = G$: G est exactement l'ensemble des solutions de (\mathcal{E}) .



Évariste Galois



Emmy Noether



Leopold Kronecker



Richard Dedekind