

**Exercice 1** *Différences finies de Newton*

1. Former le polynôme d'interpolation  $P_f$  de Newton pour la fonction  $f$  donnée par le tableau

$x$	0	1	2	3	4
$f(x)$	1	4	15	40	85

2. En utilisant la constance des différences du quatrième ordre, former le tableau des différences de la fonction  $y = x^4 - 10x^3 + 2x^2 + 3x$  pour les valeurs entières de  $x$  telles que  $1 \leq x \leq 10$ .
3. On donne le tableau

$\log(1)$	$\log(2)$	$\log(3)$	$\log(4)$	$\log(5)$
0,000	0,301	0,477	0,602	0,699

Calculer, par interpolation linéaire puis par la méthode de Newton d'ordre 2, les nombres  $\log(1,7)$ ,  $\log(2,5)$ ,  $\log(3,1)$  et  $\log(4,6)$ . Comparer aux résultats donnés par une calculatrice.

4. Trouver  $(y_k)_{k \in \mathbb{N}}$  tel que  $\Delta y_k = y_k$ . Même chose pour  $\Delta y_k = 2y_k$ .
5. En trouver deux tels que  $\Delta^2 y_k = 9y_k$ . Peut-on en trouver un tel qu'en sus  $y_0 = 0$  et  $y_1 = 1$  ?
6. Former le polynôme d'interpolation  $P_g$  de Newton pour la fonction  $g$  donnée par le tableau

$x$	2	4	6	8	10
$g(x)$	3	11	27	50	83

On pourra écrire  $g(2x+2) = h(x)$  et plutôt considérer  $h$ . Calculer  $y = P_g(x)$  pour  $x = 5,5$ . Pour quelle valeur de  $x$ , a-t-on  $y = 20$  ?

7. Former le tableau des différences finies de la fonction  $y = x^3 - 5x^2 + x - 1$  pour les valeurs  $x = 1, 3, 5, 7, 9, 11$ . Vérifier que toutes les différences finies du troisième ordre sont égales.
8. On donne le tableau

$\sin(10^\circ)$	$\sin(11^\circ)$	$\sin(12^\circ)$	$\sin(13^\circ)$	$\sin(14^\circ)$	$\sin(15^\circ)$
0,1736	0,1908	0,2079	0,2250	0,2419	0,2588

Calculer par la méthode de Newton d'ordre 2, les nombres  $\sin(10^\circ 30')$ ,  $\sin(11^\circ 30')$ ,  $\sin(12^\circ 30')$ ,  $\sin(13^\circ 30')$  et  $\sin(14^\circ 30')$ . Comparer aux résultats donnés par une calculatrice.

9. Utiliser la méthode de Newton pour trouver le nombre mal imprimé dans la liste suivante

1 2 4 8 16 26 42 64 93 .

On pourra calculer les différences successives pour une « erreur de taille 1 »

0	1	2	3	4
0	0	1	0	0

**Exercice 2** *Approximations*

Calculer approximativement, à partir des formules du cours, puis comparer avec le résultat donné par une calculatrice. On rappelle que  $\log_{10}(e)$  est approximativement égal à 0,43429.

1.  $\frac{1}{1,02}$ ,  $\frac{1}{0,97}$ ,  $\frac{1}{105}$ ,  $\frac{1}{998}$ ,  $\frac{1}{505}$  et  $\frac{1}{0,98}$ .
2.  $\sqrt{1,06}$ ,  $\sqrt{15}$ ,  $\sqrt{0,97}$ ,  $\sqrt{10}$ ,  $\sqrt{120}$  et  $\sqrt{0,17}$ .
3.  $1,04^3$ ,  $1,07^5$ ,  $0,93^4$ ,  $1,002^{17}$ ,  $101^4$  et  $0,998^6$ .
4.  $\log(1,1)$ ,  $\log(0,9)$ ,  $\log(1/1,03)$ ,  $\log_{10}(1,1)$ ,  $1/\log(1,2)$  et  $\log_{10}(0,9)$ .

**Exercice 3** *Équations fonctionnelles*

Démontrer les identités suivantes, définies pour  $x$  et  $y$  réels.

1. Si  $f(x) = \log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ , alors  $f(x) + f(y) = f\left(\frac{x+y}{1+xy}\right)$ .
2. Soit  $a$  un réel strictement positif,  $\phi(x) = (a^x + a^{-x})/2$  et  $\psi(x) = (a^x - a^{-x})/2$ . Alors  $\phi(x+y) = \phi(x)\phi(y) + \psi(x)\psi(y)$ .
3. Avec les mêmes notations que précédemment  $\psi(x+y) = \phi(x)\psi(y) + \psi(x)\phi(y)$ .

**Exercice 4** (\*) *Calcul de racines carrées*

Soit  $a$  un entier naturel non nul. On pose  $r = (\sqrt{a^2+1} - a)/a$ .

1. Montrer

$$\frac{1}{2a} - \frac{1}{8a^3} < \sqrt{a^2+1} - a < \frac{1}{2a}$$

et en déduire que  $a$  est l'entier le plus proche de  $\sqrt{a^2+1}$ . En déduire une valeur approchée de  $\sqrt{626}$  à  $10^{-5}$  par excès.

2. On définit une suite  $(t_n)_{n \in \mathbf{N}}$  par  $t_0 = a$  et, pour  $n$  entier naturel,  $t_{n+1} = t_n + \frac{1}{2a}(a^2 + 1 - t_n^2)$ . Montrer comment obtenir graphiquement les termes de la suite (on pourra prendre  $a = 2$  dans le graphique).
3. Montrer que la suite ainsi définie est à valeurs rationnelles et que, si elle converge, sa limite est  $\sqrt{a^2+1}$ .
4. On pose, pour tout entier naturel  $n$ ,  $e_n = |t_n - \sqrt{a^2+1}|$ . Montrer que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $e_{n+1} = e_n \left( \frac{\sqrt{a^2+1} + t_n}{2a} - 1 \right)$  et  $a \frac{r^{n+1}}{2^n} \leq e_n \leq \frac{1}{2a} \left( \frac{1}{2a^2} \right)^n$ .
5. En déduire que la suite  $(t_n)_{n \in \mathbf{N}}$  est convergente.
6. Montrer que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $e_{n+1} = r \cdot e_n \left( 1 + (-1)^{n+1} \frac{e_n}{2ar} \right)$  et en déduire que la suite de terme général  $e_n/r^n$  est convergente, et que sa limite est un réel strictement positif et strictement inférieur à  $\exp(1/2r(2a^2 - 1))/2a$ .