

Exercice 1 *Espaces vectoriels*

Déterminer si les ensembles suivants sont des \mathbf{R} -espaces vectoriels. Si oui, en donner dimension et base.

1. $E_1 = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid (x + y)^2 + (x - y)^2 = 0\}$
2. $E_2 = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid (x + y)^2 - (x - y)^2 = 0\}$
3. $E_3 = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid e^x e^y = 0\}$
4. $E_4 = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid \sin^2(x) + \sin^2(y) = 0\}$
5. $E_5 = \{(x, y) \in \mathbf{R}^3 \mid (x - y)^2 - (y - z)^2 - (z - x)^2 = 2(x - z)(z - y)\}$
6. $E_6 = \{(x, y) \in \mathbf{R}^3 \mid xz + y^2 = x + 2y - z = 0\}$
7. $E_7 = \{(x, y) \in \mathbf{R}^4 \mid x + y + z + t = x - y - z - t = 0\}$

Exercice 2 *Matrices par blocs*

Soit A une matrice décomposée en blocs, c'est-à-dire qu'on écrit

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \\ A_{m1} & A_{m2} & \cdots & A_{mn} \end{pmatrix}$$

où les A_{ij} sont des matrices de taille $p_i \times q_j$ pour des entiers (p_1, \dots, p_m) et (q_1, \dots, q_n) . Soit B une matrice décomposée en blocs B_{jk} de tailles $q_j \times r_k$. Montrer que $C = AB$ se décompose en blocs de tailles $p_i \times r_k$ avec $C_{ik} = \sum_j A_{ij} B_{jk}$.

Exercice 3 *Applications linéaires*

1. Soit E le \mathbf{R} -espace vectoriel des fonctions de la forme $x \mapsto f(x) = a \cos(x) + b \sin(x) + c$ pour a, b et c réels. Soit φ et ψ de E dans lui-même définies par $\varphi(f)(x) = f(\frac{\pi}{2} - x)$ et $\psi(f)(x) = f'(x)$.
 - (a) Montrer que φ et ψ sont des endomorphismes de E .
 - (b) Comparer $\varphi \circ \psi$ et $\psi \circ \varphi$.
2. Soit E l'espace vectoriel des polynômes à coefficients complexes de degré inférieur (ou égal) à n .
 - (a) Montrer que les applications d et u définies par $d(P) = P'$ et $u(P) = P - P'$ sont des endomorphismes de E .
 - (b) Montrer que u est inversible et exprimer u^{-1} au moyen de d .
3. Pour $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$, montrer que $\dim(\text{Ker}(v \circ u)) \leq \dim(\text{Ker}(u)) + \dim(\text{Ker}(v))$.
4. Pour u et v dans $\text{End}(E)$, montrer $\dim(E) + \text{rg}(v \circ u) \geq \text{rg}(v) + \text{rg}(u)$.
5. Pour E de dimension inférieure à 3, donner tous les u dans $\text{End}(E)$ tels que $u \circ u = 0$.
6. Soit u dans $\text{End}(E)$. Montrer que les quatre propriétés suivantes sont équivalentes :
 - (a) $E = \text{Im}(u) + \text{Ker}(u)$
 - (b) $E = \text{Im}(u) \oplus \text{Ker}(u)$
 - (c) $\text{Im}(u \circ u) = \text{Im}(u)$
 - (d) $\text{Ker}(u \circ u) = \text{Ker}(u)$.
7. Soit A et B deux espaces supplémentaires d'un espace vectoriel E , a la projection sur A parallèlement à B et b la projection sur B parallèlement à A . Soit p, q et u les applications de $\text{End}(E)$ dans lui-même définies par $p(x) = a \circ x \circ a$, $q(x) = b \circ x \circ b$ et $u(x) = a \circ x - x \circ a$. Soit enfin $r = u \circ u$.
 - (a) Montrer que p, q et r sont des projecteurs linéaires et qu'on a $p + q + r = \text{Id}$.
 - (b) Calculer les applications obtenues par composition de p, q ou r avec l'une des autres.
 - (c) Montrer $\text{Ker}(r) = \text{Im}(p) \oplus \text{Im}(q)$.

Exercice 4 *Polynômes de Newton*

On se place dans l'espace vectoriel E_n des polynômes à coefficients complexes de degré inférieur à n . On note $U_0 = 1$ et, pour $1 \leq k \leq n$, $U_k(X) = X(X-1) \cdots (X-k+1)$.

1. Montrer qu'il existe une application linéaire et une seule de E_n dans lui-même qui vérifie les $n+1$ conditions $\varphi(X^k) = U_k$. Montrer qu'elle est bijective.
2. On définit une application δ de E_n dans lui-même par $\delta(P)(X) = P(X+1) - P(X)$. Montrer que δ est linéaire et déterminer les polynômes $\delta(U_k)$.
3. Déterminer le noyau et l'image de δ .
4. Montre que, pour tout polynôme R , l'équation en n et $P \in E_n : P(0) = 0$ et $\delta(P) = R$ admet une unique solution en P , indépendante de n pour peu qu'il soit assez grand.
5. Déterminer P pour $R(X) = X^3 - 5X^2 + X + 1$.
6. Déterminer l'application $d = \varphi^{-1} \circ \delta \circ \varphi$.

Exercice 5 *Équations différentielles*

On se place dans l'espace vectoriel E des fonctions deux fois dérivables de \mathbf{R} dans \mathbf{C} .

1. Montrer que l'ensemble F des solutions de l'équation différentielle $y'' + ay' + by = 0$, avec a et b dans \mathbf{C} fixés, est un sous-espace vectoriel de E . Donner sa dimension.
2. Montrer que l'application δ qui à une fonction associe sa dérivée est bien définie de F dans lui-même et est une application linéaire.
3. Montrer que δ n'est pas proportionnelle à l'application identique, Id .
4. Montrer que δ est bijective sauf pour certaines valeurs de a et b que l'on explicitera.
5. Montrer $\delta \circ \delta + a \cdot \delta + b \cdot Id = 0$, puis qu'il existe α et β complexes tels que $(\delta - \alpha \cdot Id) \circ (\delta - \beta \cdot Id) = 0$.
6. Montrer que les applications $\delta - \lambda \cdot Id$ ne sont pas inversibles lorsque λ vaut α ou β . Déterminer alors image et noyau de ces applications.
7. Montrer que dans le cas contraire, ces applications sont inversibles.

Exercice 6 *Endomorphismes nilpotents (*)*

Soit E un \mathbf{K} -espace vectoriel et u dans $End(E)$. On dit que u est nilpotent s'il existe un entier p supérieur à 2 tel que $u^p = 0$ (i.e. $u \circ u \circ \cdots \circ u = 0$). On dit qu'il est nilpotent d'indice p si p est le plus petit entier tel que $u^p = 0$. Dans la suite on fixe un endomorphisme u nilpotent d'indice p .

1. Soit x dans E , montrer que $(x, u(x), u^2(x), \dots, u^{p-1}(x))$ est libre si et seulement si $u^{p-1}(x) \neq 0$.
2. Montrer qu'on a une suite d'inclusions strictes

$$\{0\} \subset \text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(u^2) \subset \cdots \subset \text{Ker}(u^p) .$$

3. En déduire $p \leq \dim(E)$.
4. Si $p = \dim(E)$, montrer qu'il existe une base de E telle que la matrice de u relativement à cette base admet des coefficients égaux à 1 juste au-dessus de la diagonale et des 0 ailleurs. Donner l'expression de la matrice de u^k dans cette base, pour tout entier k .