

**Exercice 1 Applications**

1. Soit  $\Gamma \subset X \times Y$ . Montrer :  $\Gamma$  est un graphe fonctionnel  $\Leftrightarrow pr_1$  est bijective.
2. Soit  $f : E \rightarrow F$  une application. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes : (1)  $f$  est surjective; (2)  $\forall y \in F, f_*(f^*(\{y\})) = \{y\}$ ; (3)  $\forall Y \subset F, f_*(f^*(Y)) = Y$ ; (4)  $\forall Y \subset F, f^*(Y) = \emptyset \Rightarrow Y = \emptyset$ . Trouver un énoncé analogue pour les applications injectives.
3. Soit  $f : E \rightarrow F$  une application. Montrer :  $f$  est injective  $\Leftrightarrow \forall X \times Y \subset E^2, f_*(X \cap Y) = f_*(X) \cap f_*(Y)$ .
4. Théorème de factorisation : soit  $f : X \rightarrow Y$  et  $h : X \rightarrow Z$ . Montrer :  $(\exists g : Y \rightarrow Z, h = g \circ f) \Leftrightarrow (\forall (x, x') \in X^2, (f(x) = f(x') \Rightarrow h(x) = h(x')))$ . Justifier l'appellation du théorème. A quelle condition  $g$  est-elle uniquement déterminée ?
5. Soit  $f : X \rightarrow Y$  une application entre ensembles non vides. Montrer :  $f$  injective  $\Leftrightarrow \exists g : Y \rightarrow X, g \circ f = Id_X$ . Autrement dit  $f$  est injective si et seulement si elle est inversible à gauche.
6. Soit  $f : X \rightarrow Y$  une application entre ensembles non vides. Montrer :  $f$  surjective  $\Leftrightarrow \exists h : Y \rightarrow X, f \circ h = Id_Y$ . Autrement dit  $f$  est surjective si et seulement si elle est inversible à droite.
7. Soit  $f : X \rightarrow Y$  une application entre ensembles non vides. Montrer :  $f$  bijective  $\Leftrightarrow \exists g : Y \rightarrow X, g \circ f = Id_X \wedge f \circ g = Id_Y$ .
8. Soit  $f : X \rightarrow Y$  et  $g : Y \rightarrow Z$ . Montrer :  $(g \circ f \text{ injective} \wedge f \text{ surjective}) \Rightarrow g \text{ injective}$ .
9. Soit  $f : X \rightarrow Y$  et  $g : Y \rightarrow Z$ . Montrer :  $(g \circ f \text{ surjective} \wedge g \text{ injective}) \Rightarrow f \text{ surjective}$ .
10. Soit  $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$  et  $h : Z \rightarrow X$ . On suppose que parmi les trois applications  $h \circ g \circ f, g \circ f \circ h$  et  $f \circ h \circ g$  deux sont surjectives et la dernière injective. Montrer que  $f, g$  et  $h$  sont bijectives. Même conclusion en échangeant surjectif et injectif.

**Exercice 2 Anneaux**

On note  $(A, +, \cdot)$  un anneau.

1. Formule du multinôme : soit  $p \geq 2$  et  $(a_i)_{1 \leq i \leq p} \in A^p$  une famille d'éléments commutants deux à deux. Montrer que, pour tout entier naturel non nul  $n$ , on a

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_p)^n = \sum_{|\alpha|=n} \frac{n!}{\alpha_1! \dots \alpha_p!} a_1^{\alpha_1} \dots a_p^{\alpha_p}$$

où la somme est étendue sur les  $p$ -uplets  $\alpha$  dans  $\mathbf{N}^p, \alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_p)$  avec  $\alpha_1 + \dots + \alpha_p = n$ .

2. Soit  $E$  un ensemble. Montrer que  $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$  est un anneau commutatif.
3. On appelle anneau de Boole un anneau  $A$  dans lequel tout élément  $x$  de  $A$  vérifie  $x^2 = x$ . Soit  $A$  un tel anneau.
  - (a) Montrer  $\forall x \in A, 2x = 0$ . (On rappelle qu'on a, par définition,  $2x = x + x$ .)
  - (b) Montrer que  $A$  est commutatif.
  - (c) Calculer  $xy(x + y)$  pour  $x$  et  $y$  dans  $A$ . En déduire que si  $A$  possède plus de deux éléments, il n'est pas intègre.
  - (d) Montrer par un exemple que  $A$  peut être de cardinal 2. Peut-il être de cardinal 3 ?
  - (e) Montrer que  $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$  est un anneau de Boole.
  - (f) Soit  $\mathcal{R}$  la relation dans  $A$  définie par  $x\mathcal{R}y \equiv xy = x$ . Montrer que  $\mathcal{R}$  est une relation d'ordre. On note  $\leq$  cet ordre. Est-il compatible à l'addition et à la multiplication, i.e.  $\forall (x, y, z) \in A^3, (x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z) \wedge ((0 \leq x \wedge 0 \leq y) \Rightarrow 0 \leq xy)$  ?

**Exercice 3** *Théorie des ensembles*

1. Soit  $A, B$  et  $C$  des sous-ensembles de  $E$ . On note  $\bar{B} = E \setminus B$ . Montrer  $A \cap B = A \cap C \Leftrightarrow A \cap \bar{B} = A \cap \bar{C}$ .
2. Établir par deux méthodes  $A \cap B = A \cup B \Rightarrow A = B$ .
3. Résoudre dans  $\mathcal{P}(E)$  l'équation en  $X$ ,  $A \cap X = B$ . Idem pour  $X \cup A = B$ .
4. Montrer  $(A \cup B = A \cap C) \wedge (A \cup C = C \cap B) \wedge (B \cup C = B \cap A) \Rightarrow A = B = C$ .
5. Exprimer  $1_{A \Delta B}$  en fonction de  $1_A$  et  $1_B$  et en déduire  $(A \Delta B) \cap C = (A \cap C) \Delta (B \cap C)$ .
6. Donner des relations entre  $A \Delta (B \cap C)$  et  $(A \Delta B) \cap (A \Delta C)$  ainsi qu'entre  $A \Delta (B \cup C)$  et  $(A \Delta B) \cup (A \Delta C)$ . Quand y a-t-il égalité?
7. Trouver une bijection entre  $C^{A \times B}$  et  $(C^A)^B$ .
8. Soit  $(E, \leq)$  et  $(F, \leq)$  deux ensembles ordonnés ayant chacun au moins deux éléments. Montrer qu'il n'existe pas d'ordre total sur  $E \times F$  tel que les projections  $pr_1$  et  $pr_2$  soient croissantes. Montre qu'en revanche il existe une structure d'ordre telle que  $pr_1$  soit croissante et telle que, pour tout  $x$  de  $E$ ,  $pr_2$  est croissante sur  $pr_1^*(\{x\})$ . Quel est cet ordre?

**Exercice 4** *Théorème de Cantor-Bernstein (\*)*

Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles. On veut montrer que la relation  $\mathcal{R}$ , définie par  $ERF \equiv \exists f : E \rightarrow F$  injective, est une relation d'ordre sur les ensembles considérés à isomorphisme près et que l'ordre opposé est obtenu en remplaçant injectif par surjectif. La réflexivité et la transitivité sont immédiates.

1. Montrer :  $\exists f : E \rightarrow F$  injective  $\Leftrightarrow \exists g : F \rightarrow E$  surjective.
2. Soit  $f : E \rightarrow F$  injective et  $g : F \rightarrow E$  injective. On se propose de construire une bijection de  $E$  sur  $F$ . On considère  $h = g \circ f$  et  $G = E \setminus g_*(F)$ .
  - (a) Soit  $\mathcal{F} = \{X \subset E \mid G \cup h(X) \subset X\}$ . Montrer que  $\mathcal{F}$  est non vide.
  - (b) Soit  $(X_i)_{i \in I}$  une famille d'éléments de  $\mathcal{F}$ . Montrer  $\bigcap_{i \in I} X_i \in \mathcal{F}$ .
  - (c) Soit  $X \in \mathcal{F}$ . Montrer  $G \cup h(X) \in \mathcal{F}$ .
  - (d) On pose  $A = \bigcap_{X \in \mathcal{F}} X$ ,  $B = E \setminus A$ ,  $A' = f_*(A)$  et  $B' = g^*(B)$ . Montrer :  $A' \cap B' = \emptyset$  et  $A' \cup B' = F$ , i.e.  $(A', B')$  est une partition de  $F$ .
  - (e) Montrer qu'on définit une application  $\varphi$  de  $E$  dans  $F$  en posant :  $\varphi(x) = f(x)$  si  $x \in A$  et  $g \circ \varphi(x) = x$  si  $x \in B$ .
  - (f) Montrer que  $\varphi$  est une bijection de  $E$  sur  $F$ .