

**Exercice 1** *Nombres réels*

1. Soit  $a$  et  $b$  deux réels tels que, pour tout réel  $x$  tel que  $x > b$ , on a  $a \leq x$ . Montrer  $a \leq b$ .
2. Si la suite  $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$  a une limite  $\ell$  telle que, pour tout réel  $x$  tel que  $x > b$ , on a  $u_n \leq x$  à partir d'un certain rang, montrer  $\ell \leq b$ .
3. Résoudre dans  $\mathbf{R}$  l'équation  $\sqrt{\sqrt{2-x^2}+1} = x$ .
4. Pour  $a$  dans  $\mathbf{R}_+$ , donner l'ensemble des solutions de l'inéquation  $x - \frac{1}{2} \leq \sqrt{x+a^2 - \frac{3}{4}}$ .
5. Montrer que les sous-ensembles suivants de  $\mathbf{R}$  sont non vides et majorés, donner leur borne supérieure et indiquer quand ils ont un plus grand élément.

$$[0; 1] \cap \mathbf{Q}, \quad \bigcup_{n \in \mathbf{N}^*} \left[ -\frac{1}{2n}; -\frac{1}{2n+1} \right]$$

$$\{xy \mid (x, y) \in \mathbf{R}^2, \|(x, y)\|_1 \leq 1\}, \quad \{xy \mid (x, y) \in \mathbf{R}^2, \|(x, y)\|_1 < 1\}$$

avec  $\|(x, y)\|_1 = |x| + |y|$ .

6. Soit  $A$  et  $B$  deux parties non vides de  $\mathbf{R}$  telles que  $B \subset A$  et  $A$  est majoré. Montrer que  $B$  est majoré et qu'on a  $\sup B \leq \sup A$ .
7. Soit  $A$  et  $B$  deux parties non vides bornées de  $\mathbf{R}$ . Montrer que  $A \cup B$  est borné et  $\sup(A \cup B) = \sup(\sup A, \sup B)$  et  $\inf(A \cup B) = \inf(\inf A, \inf B)$ .
8. Avec les hypothèses précédentes, montrer que  $A \cap B$  est borné et  $\sup(\inf A, \inf B) \leq \inf(A \cap B) \leq \sup(A \cap B) \leq \inf(\sup A, \sup B)$ . Donner des exemples où les inégalités sont strictes.
9. On rappelle que si  $A$  et  $B$  sont des sous-ensembles d'un groupe additif, on note  $A + B$  l'ensemble des éléments de la forme  $a + b$  avec  $(a, b) \in A \times B$ . Montrer que si  $A$  et  $B$  sont des parties non vides majorées de  $\mathbf{R}$ , on a  $\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B)$ . Peut-on donner un analogue pour  $AB$ ?
10. Soit  $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$  et  $(y_n)_{n \in \mathbf{N}}$  deux suites majorées de réels. Montrer  $\sup_{n \in \mathbf{N}} (x_n + y_n) \leq \sup_{n \in \mathbf{N}} (x_n) + \sup_{n \in \mathbf{N}} (y_n)$  et donner un exemple où l'inégalité est stricte.
11. Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions croissantes de  $[0; 1]$  dans lui-même. On suppose  $g$  surjective,  $g(0) < f(0)$  et  $g(1) > f(1)$ . Montrer que  $\{x \in [0; 1] \mid g(x) < f(x)\}$  admet une borne supérieure  $\alpha$  et montrer  $g(\alpha) \geq f(\alpha)$ . En déduire que les graphes de  $f$  et  $g$  ont un point commun.

**Exercice 2** *Construction de polygones réguliers à la règle et au compas (\*)*

On cherche à construire l'angle  $\alpha_n = 2\pi/n$  à la règle et au compas, ou encore  $\exp(i\alpha_n)$ .

1. On suppose  $n$  premier et on s'intéresse aux racines du polynôme  $\Phi_n(X) = X^{n-1} + \dots + X + 1$ . Exprimer les racines de  $\Phi_3$  et  $\Phi_5$  uniquement en extrayant des racines carrées.
2. On considère  $\Phi_{17}$ . Montrer que  $e_k = \exp(ik\alpha_{17})$  parcourt les racines de  $\Phi_{17}$  si  $1 \leq k \leq 16$ .
3. Montrer que 3 est d'ordre 16 modulo 17 et que, pour tout entier  $m$ ,  $-3^m \equiv 3^{m+8} \pmod{17}$ .
4. On note  $x_i = \sum_{m \equiv i \pmod{2}} e_{3^m}$  pour  $0 \leq i \leq 1$  et  $y_i = \sum_{m \equiv i \pmod{4}} e_{3^m}$  pour  $0 \leq i \leq 3$ . Exprimer les  $x_i$  et les  $y_i$  comme sommes de cosinus de multiples de  $\alpha_{17}$ .
5. Montrer que  $x_0$  et  $x_1$  sont racines de  $X^2 + X - 4$  et que  $x_0$  est la plus grande des racines.
6. Montrer que  $y_0$  et  $y_2$  sont racines de  $X^2 - x_0X - 1$  et que  $y_0$  est la plus grande des racines.
7. Montrer que  $y_1$  et  $y_3$  sont racines de  $X^2 - x_1X - 1$  et que  $y_1$  est la plus grande des racines.
8. Montrer que  $2 \cos(\alpha_{17})$  et  $2 \cos(4\alpha_{17})$  sont racines de  $X^2 - y_0X + y_1$  et en déduire

$$\cos(\alpha_{17}) = \frac{-1 + \sqrt{17} + \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} + \sqrt{68 + 12\sqrt{17} - 16\sqrt{34 + 2\sqrt{17}} - 2(1 - \sqrt{17})\sqrt{34 - 2\sqrt{17}}}}{16}.$$

9. Expliquer pourquoi cette méthode, due à Gauß, ne fonctionne que si  $n$  est un nombre premier de la forme  $2^k + 1$ . Montrer qu'alors  $n$  est un nombre de Fermat, i.e. de la forme  $F_m = 2^{2^m} + 1$ .