

**Exercice 1** *Comportements asymptotiques, limites, fonctions*

1. Trouver la limite de  $\sqrt[n]{n^3 + 1}$ .
2. Soit  $u_n(a) = \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n$ . Chercher équivalent de  $u_n(a+b) - u_n(a)u_n(b)$ .
3. Soit  $(u_n)$  une suite réelle décroissante telle que  $u_n + u_{n+1} \sim \frac{1}{n}$ . Démontrer  $\lim u_n = 0$  et  $u_n \sim \frac{2}{n}$ .
4. Montrer l'existence d'une suite réelle  $(u_n)$  supérieure à 1 vérifiant  $\forall n \in \mathbf{N}^*$ ,  $u_n - \ln(u_n) = n$ .  
Montrer  $u_n = n + \ln(n) + \frac{\ln(n)}{n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n}\right)$ .
5. Montrer l'existence d'une suite réelle  $(u_n)$  vérifiant  $\forall n \in \mathbf{N}^*$ ,  $u_n^n + nu_n = 1$ . Que valent  $u_1$  et  $u_2$ ?  
Montrer  $u_n \sim \frac{1}{n}$ .
6. Trouver les points de (dis)continuité des fonctions  $x \mapsto \sqrt{x - E(x)}$  et  $x \mapsto E(x) + \sqrt{x - E(x)}$ .
7. Étudier la continuité ou proposer un prolongement par continuité de la fonction  $f$  :
  - (a)  $f$  est la fonction définie par  $f(x) = \sin\left(xE\left(\frac{\pi}{x}\right)\right)$ .
  - (b)  $f$  est la fonction définie par  $f(x) = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^{\ln(x)}$ .
8. Calculer les limites en 0 de  $\frac{e^{x^2+x} - e^{2x}}{\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) - 1}$ ,  $\frac{\sin(\sinh(x)) - \sinh(\sin(x))}{x}$ ,  $\frac{\sqrt{1 + \sin(x)} - \cos(x)}{\arcsin(x)}$  et  $\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos(x)\right)}{\sin(\sin(x))}$ .
9. Pour  $n \in \mathbf{N}$ , on pose  $f_n(x) = x^n(1-x)$ . Déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in [0,1]} f_n(x)$ .
10. Trouver  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que  $\sqrt[3]{x^3 - 6x^2} = ax + b + \frac{c}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$ .
11. Soit  $f$  de  $[0; 1]$  dans lui-même, croissante. Montrer qu'elle admet un point fixe ( $f(a) = a$ ).
12. Soit  $g$  de  $\mathbf{R}$  dans lui-même définie par  $g(x) = \frac{\sin(x)}{1+x^2} - \frac{1}{x^4+1} + \frac{1}{x^6+1}$ . Trouver  $M > 0$  tel que, si  $|x| > M$ , on ait  $|g(x)| \leq 1/100$  (on ne demande pas le meilleur  $M$  possible) et montrer  $g(-1) < -\frac{1}{100} < \frac{1}{100} < g(1)$ . En déduire que  $g$  est bornée sur  $\mathbf{R}$  et atteint ses bornes.
13. Les conclusions de l'exercice précédent sont-elles valides pour la fonction  $x \mapsto 1/(1+x^2)$ ?

**Exercice 2** *Continuité*

1. Soit  $f$  une fonction continue sur un intervalle et à valeurs dans  $\{-1; +1\}$ . Montrer que  $f$  est constante. En déduire que si  $f$  et  $g$  sont deux fonctions continues sur un intervalle et ne s'annulant pas, telles que  $|f| = |g|$ , on a  $f = g$  ou  $f = -g$ .
2. Soit  $f$  et  $g$  continues sur  $[a; b]$  avec, pour tout  $x$  dans  $[a; b]$ ,  $f(x) > g(x)$ . Montrer  $\exists \lambda > 0, \forall x \in [a; b], f(x) \geq g(x) + \lambda$ .
3. (**Points fixes**) Soit  $f$  continue de  $I = [a; b]$  dans lui-même.
  - (a) Montrer, en considérant  $f(x) - x$ , que  $f$  admet un point fixe (i.e. tel que  $f(c) = c$ ).
  - (b) Montrer que ce point fixe est unique lorsque  $f$  est décroissante.
  - (c) Montrer que c'est encore le cas si  $f$  est  $k$ -lipschitzienne avec  $k < 1$  (i.e.  $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$ ).
  - (d) Montrer enfin que  $f$  a au plus deux points fixes lorsqu'elle est strictement convexe (i.e.  $f((1-t)x + ty) < (1-t)f(x) + tf(y)$  lorsque  $0 < t < 1$  et  $x \neq y$ ).
4. Soit  $f$  continue de  $[0; 1]$  dans lui-même telle que, pour tous  $x, y$  dans  $[0; 1]$ , on ait  $|f(x) - f(y)| \geq |x - y|$ . Montrer que  $f$  est l'une des fonctions  $x \mapsto x$  ou  $x \mapsto 1 - x$ . (Considérer  $f(0)$  et  $f(1)$ .)

5. Soit  $f$  continue sur  $[0; 1]$  tel que  $f(0) = f(1)$ . Démontrer  $\forall n \geq 1, \exists x_n \in [0; 1]$  tel que  $f(x_n) = f(x_n + \frac{1}{n})$ .
6. (**Fonctions additives continues**) Soit  $a$  un réel et  $f$  une fonction continue de  $\mathbf{R}$  dans lui-même telle que  $f(1) = a$  et, pour tous réels  $x$  et  $y$ ,  $f(x + y) = f(x) + f(y)$ . Montrer  $f(n) = na$  pour  $n$  dans  $\mathbf{Z}$ , puis  $f(1/q) = a/q$  pour  $q$  dans  $\mathbf{N}^*$  et enfin  $f(r) = ra$  pour  $r \in \mathbf{Q}$ . Conclure, en utilisant la continuité de  $f$  et la densité de  $\mathbf{Q}$  dans  $\mathbf{R}$ , que  $f$  est linéaire.
7. (**Homomorphismes continus de  $(\mathbf{R}_+^*, \times)$  dans  $(\mathbf{R}, +)$** ) Soit  $f$  de  $\mathbf{R}_+^*$  dans  $\mathbf{R}$ , continue en 1 et vérifiant  $f(xy) = f(x) + f(y)$ . Montrer  $f(1) = 0$  et  $f(1/x) = -f(x)$  pour  $x > 0$ . Montrer que  $f$  est continue sur  $\mathbf{R}_+^*$  (on écrira  $x + h = x(1 + h/x)$ ). En posant  $f(2) = a$ , calculer  $f(2^n)$ ,  $f(2^{1/q})$  et enfin  $f(2^{p/q})$  pour  $n, p$  et  $q$  entiers ( $q \neq 0$ ). En déduire qu'il existe une constante  $C$  telle que  $f(r) = C \ln(r)$  pour tout rationnel  $r$ . Conclure, enfin, que  $f = C \ln$  en utilisant la continuité de  $f$ .
8. (**Fonctions convexes**)
  - (a) Montrer qu'une fonction continue sur un intervalle vérifiant  $f(\frac{x+y}{2}) \leq \frac{1}{2}(f(x) + f(y))$  est convexe.
  - (b) Soit  $A$  l'ensemble des fonctions continues de  $\mathbf{R}$  dans  $\mathbf{R}$  vérifiant, pour tous  $x$  et  $y$  réels,  $f(\frac{x+y}{2}) = \frac{1}{2}(f(x) + f(y))$ . Montrer  $(f, g) \in A^2 \Rightarrow f - g \in A$  et que  $A$  contient les fonctions affines. Soit  $f$  dans  $A$  et  $a < b$  tels que  $f(a) = f(b) = 0$ ; montrer que  $f(a + k\frac{b-a}{2^n}) = 0$  si  $0 \leq k \leq 2^n$ . En conclure que  $f$  est nulle sur  $[a; b]$ , puis sur  $\mathbf{R}$ . Montrer  $f \in A \Rightarrow f$  est affine.

**Exercice 3** *Sous-groupes de  $\mathbf{R}$ , densité et fonctions périodiques*

1. Montrer qu'une fonction continue sur  $\mathbf{R}$  et périodique est bornée.
2. Soit  $A$  un sous-groupe additif de  $(\mathbf{R}, +)$  non réduit à  $\{0\}$  et  $a = \inf(A \cap \mathbf{R}_+^{\times})$ .
  - (a) Montrer que si  $a > 0$ , alors  $a \in A$ . En déduire  $A = a\mathbf{Z} = \{na \mid n \in \mathbf{Z}\}$ .
  - (b) Montrer que si  $a = 0$ , alors  $A$  est dense dans  $\mathbf{R}$ , i.e. que tout intervalle  $I$  non réduit à un point contient au moins un point de  $A$ .
3. Montrer qu'une fonction continue sur  $\mathbf{R}$  admettant 1 et  $\sqrt{2}$  comme périodes est nécessairement constante.
4. En considérant  $\{n + 2k\pi \mid (n, k) \in \mathbf{Z}\}$ , montrer que tout intervalle non réduit à un point et contenu dans  $[-1; 1]$  contient au moins un nombre de la forme  $\sin(n)$ , avec  $n$  entier.

**Exercice 4** *Dimension fractale (\*)*

Soit  $K$  une partie fermée et bornée de  $\mathbf{R}$ . On dit que  $\mathcal{U} = (I_k)_{1 \leq k \leq n}$  est un recouvrement fini de  $K$  par des intervalles si :  $K \subset \cup_{k=1}^n I_k$  avec, pour tout  $1 \leq k \leq n$ ,  $I_k = ]x_k - r_k; x_k + r_k[$  pour  $x_k \in \mathbf{R}$  et  $r_k > 0$ . On pose alors  $r_K(\mathcal{U}) = \max_{n \in E} r_n$  et, pour  $d$  dans  $\mathbf{R}_+$ , on note  $f_K(d, \mathcal{U}) = \sum_{n \in E} r_n^d$ .

1. On pose  $g_{K, \varepsilon}(d) = \inf_{\mathcal{U}/r_K(\mathcal{U}) \leq \varepsilon} f_K(d, \mathcal{U})$ , l'infimum étant pris parmi tous les recouvrements de  $K$  tels que  $r_K(\mathcal{U}) \leq \varepsilon$ . On ne suppose pas que cette quantité est finie, autrement dit  $g_{K, \varepsilon}(d) \in \mathbf{R}_+ \cup \{+\infty\}$ . Montrer qu'on a  $\sup_{\varepsilon \in \mathbf{R}_+^{\times}} g_{K, \varepsilon}(d) = \lim_{\varepsilon \in \mathbf{R}_+^{\times}} g_{K, \varepsilon}(d)$  (en tant qu'éléments de  $\mathbf{R}_+ \cup \{+\infty\}$ ). On note  $g_K(d)$  cette limite.
2. Montrer que  $g_K$  est décroissante et qu'elle vérifie  $(d' > d \text{ et } g_K(d) < +\infty) \Rightarrow g_K(d') = 0$ .
3. En déduire qu'il existe un unique  $d_0 = d(K)$ , appelé dimension fractale (ou de Hausdorff), de  $K$  tel que  $g_K(d) = +\infty$  si  $d < d_0$  et  $g_K(d) = 0$  si  $d > d_0$ .
4. Montrer  $d(K) = \frac{\ln(2)}{\ln(3)}$  lorsque  $K = \left\{ \sum_{n=0}^{+\infty} a_n 3^{-n} \mid a_n = 0 \text{ ou } a_n = 2 \right\}$ , i.e.  $K$  est l'ensemble triadique de Cantor.