

**Exercice 1** *Intégration*

1. Calculer, pour  $a < b$ ,  $\int_a^b E(x)dx$  en justifiant son existence ( $E$  est la partie entière).
2. Soit  $f$  une fonction continue sur  $[a; b]$  à valeurs réelles. Montrer que si  $\left| \int_{[a;b]} f \right| = \int_{[a;b]} |f|$ , alors  $f$  est de signe constant sur  $[a; b]$ .
3. Soit  $f$  continue de  $[0; 1]$  dans  $\mathbf{R}$  telle que  $\int_{[0;1]} f = 1/2$ . Montrer que  $f$  a un point fixe en montrant que  $x \mapsto f(x) - x$  n'est pas de signe constant.
4. Soit  $f$  continue de  $[0; 1]$  dans lui-même telle que  $\int_0^1 f = \int_0^1 f^2$ . Montrer que  $f$  est constante (égale à 0 ou 1).
5. Soit  $f$  continue sur  $[a; b]$  à valeurs réelles. Montrer  $\left( \int_a^b f \cos \right)^2 + \left( \int_a^b f \sin \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2$  et étudier le cas d'égalité.
6. Étudier les infimum, minimum, supremum et maximum de la quantité  $\int_a^b f \times \int_a^b \frac{1}{f}$  pour  $f$  variant dans l'ensemble  $C^0([a; b]; \mathbf{R}_+^*)$ .
7. Soit  $f$  et  $g$  continues par morceaux de  $[0; 1]$  dans  $\mathbf{R}_+$  telles que  $fg \geq 1$ . Montrer  $\int_{[0;1]} f \int_{[0;1]} g \geq 1$ .
8. Pour  $p$  réel supérieur à 1 et  $f$  dans  $L^1([a; b])$ , on pose  $\|f\|_p = \left( \frac{1}{b-a} \int_a^b |f|^p \right)^{1/p}$  et  $\|f\|_\infty = \sup_{[a;b]} |f|$ . Montrer  $\|f\|_p \leq \|f\|_\infty$  et, si  $f$  est continue,  $\lim_{p \rightarrow +\infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$ .
9. Déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\pi \frac{\sin(x)}{n+x} dx$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^{1+1/n} \sqrt{1+x^n} dx$ .
10. Soit  $f$  continue de  $[0; 1]$  dans  $\mathbf{R}$ . Montrer que  $I_n = \int_0^1 x^n f(x) dx$  tend vers 0 lorsque  $n$  tend vers l'infini et, plus précisément  $\lim_{n \rightarrow +\infty} nI_n = f(1)$ .
11. Montrer que la suite définie par  $u_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(x) dx$  est décroissante et minorée. Montrer de plus qu'on a  $u_n \leq \frac{\pi}{2} \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^n + \frac{\pi}{2} - \arcsin \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$  et déterminer la limite de  $(u_n)$ .
12. Montrer que la suite précédente est donnée par  $u_{2n} = \frac{\pi}{2} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}$  et  $u_{2n+1} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}$  et en déduire
 
$$\frac{\pi}{2} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 10}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 11} \dots$$
13. Soit  $n$  un entier naturel et  $f$  une fonction continue de  $[a; b]$  dans  $\mathbf{R}$ . Montrer que si  $f$  s'annule  $n$  fois sur  $[a; b]$ , alors il existe un polynôme  $P$  de degré inférieur à  $n$  tel que  $x \mapsto f(x)P(x)$  soit de signe constant sur  $[a; b]$ . En déduire : si  $\forall 0 \leq k \leq n$ ,  $\int_a^b t^k f(t) dt = 0$ , alors  $f$  s'annule au moins  $n+1$  fois.

**Exercice 2** Sommes de Darboux/Riemann

Soit  $I$  un intervalle compact et  $\mathcal{D}$  une subdivision de  $I$ . On dit que  $(\mathcal{D}, \zeta)$  est une subdivision pointée si  $\zeta = (\zeta_i)_{1 \leq i \leq n}$  est une suite de points telle que, pour  $1 \leq i \leq n$ ,  $x_{i-1} \leq \zeta_i \leq x_i$ . On définit alors la somme de Riemann  $S(f; \mathcal{D}, \zeta)$  par

$$S(f; \mathcal{D}, \zeta) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})f(\zeta_i) .$$

1. Soit  $f$  dans  $L^1(I)$  et  $(\mathcal{D}, \zeta)$  une subdivision pointée de  $I$ . Montrer  $s(\mathcal{D}; f) \leq S(f; \mathcal{D}, \zeta) \leq S(f; \mathcal{D})$ . En déduire que si le pas de  $\mathcal{D}$  tend vers 0, alors  $S(f; \mathcal{D}, \zeta)$  tend vers  $\int_I f$ .
2. Soit  $(u_n)_{n \geq 1}$  la suite réelle définie par  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}$ . Écrire  $u_n$  comme une somme de Darboux et en déduire que la suite  $(u_n)$  est convergente. Déterminer sa limite,  $\ell$ , puis  $a$  tel que  $u_n = \ell + \frac{a}{n} + o(\frac{1}{n})$ .
3. Étudier  $u_n = \frac{1}{n} \left( \sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \dots + \sin \frac{n\pi}{n} \right)$ .
4. Étudier  $u_n = \frac{1 + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}}$ .
5. Étudier  $u_n = \frac{1}{n} \left( \frac{1}{(1 + 1/n)^2} + \frac{1}{(1 + 2/n)^2} + \dots + \frac{1}{(1 + n/n)^2} \right)$  et  $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{n + k^2}{n^3 + k^3}$ .
6. Étudier  $u_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{k + 1}{n^2 + kn}$ .
7. Étudier  $u_n = \prod_{k=1}^n \left( 1 + \frac{k}{n} \right)^{1/n}$ .
8. Calculer  $I_\alpha = \int_0^\pi \ln(1 - 2\alpha \cos(x) + \alpha^2) dx$  grâce à des sommes de Riemann (en prenant  $\zeta_i$  le plus grand possible et pour une subdivision de pas constant) et montrer  $I_\alpha = 0$  si  $|\alpha| < 1$  et  $2\pi \ln |\alpha|$  si  $|\alpha| > 1$ .
9. Que dire pour  $|\alpha| = 1$  dans la question précédente ?
10. Soit  $f$  une fonction continue, positive et décroissante sur  $\mathbf{R}_+^*$ . On pose  $u_n = \sum_{k=1}^n f(k)$  et  $v_n = \int_{[1;n]} f$ . Montrer  $u_n - f(1) \leq v_n \leq u_{n-1}$  et en déduire que  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont de même nature. En déduire la nature de  $u_n = \sum_{k=1}^n k^{-\alpha}$  pour  $\alpha \in \mathbf{R}$ .

**Exercice 3** Inégalités de convexité (\*)

Pour  $p$  réel supérieur à 1,  $I = [a; b]$  et  $f$  dans  $L^1(I)$ , on pose  $\|f\|_p = \left( \frac{1}{b-a} \int_I |f|^p \right)^{1/p}$  et  $\|f\|_\infty = \sup_I |f|$ . Si  $p > 1$ , on note  $q = p/(p - 1)$ , de sorte que  $1/p + 1/q = 1$ .

1. Montrer l'inégalité de Young :  $\forall (a, b) \in \mathbf{R}_+^2, ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ .
2. En déduire l'inégalité de Hölder : soit  $f$  et  $g$  dans  $L^1(I)$ , on a  $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$ . On pourra se ramener au cas  $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$ .
3. En utilisant l'inégalité de Hölder, montrer que, pour  $f$  dans  $L^1(I)$ ,  $p \mapsto \|f\|_p$  est croissante.
4. En utilisant l'inégalité de Hölder et la remarque  $|f + g|^p \leq (|f| + |g|)|f + g|^{p-1}$ , montrer l'inégalité de Minkowski :  $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ .