

Exercice 1 *Trigonométrie hyperbolique, fonctions réciproques*

1. Montrer $\forall x \in \mathbf{R}, 2 \operatorname{arctan}(\tanh(x)) = \operatorname{arctan}(\sinh(2x))$.
2. Montrer $\forall x \in \mathbf{R}, \sinh(x) = \frac{\tanh(x)}{\sqrt{1-\tanh^2(x)}}$ puis résoudre l'équation en $x, 2 \operatorname{argsh}(x) + \operatorname{argth}(1/2) = \operatorname{argch}(3)$.
3. Résoudre l'équation en $x, \operatorname{arctan}(x) - \operatorname{arctan}\left(\frac{x}{3}\right) = \arccos\left(\frac{x}{2}\right)$.
4. On considère l'hyperbole d'équation $x^2 - y^2 = 1$. Montrer qu'il est possible de paramétrer rationnellement la branche de droite en considérant la famille de droite passant par le point $(-1, 0)$ et de pente t . Quelle relation avec la paramétrisation du cercle ? Cela vous rappelle-t-il quelque chose qui lie \cos et \cosh ?

Exercice 2 *Formes des nombres complexes*

1. Donner la forme algébrique de $\frac{3+6i}{3-4i}, \left(\frac{1+i}{2-i}\right)^2 + \frac{1-7i}{4+3i}$ et $\frac{2+5i}{1-i} + \frac{2-5i}{1+i}$.
2. Donner la forme exponentielle de $\frac{3}{1-i}, \frac{(1+i)^3}{1-i} + \frac{(1-i)^4}{(1-i)^2}$ et $\frac{(\sqrt{6}-i\sqrt{2})(1+i)}{1-i}$.
3. Donner les formes algébrique et trigonométrique de $z = \frac{-4}{1+i\sqrt{3}}$. Calculer z^3 .
4. Soit a dans $[0, 2\pi[$. Déterminer le module et, quand cela est possible, un argument du nombre complexe : $1 + \cos a + i \sin a$. Idem pour : $\frac{1 + \sin a + i \cos a}{1 + \sin a - i \cos a}$.

Exercice 3 *Nombres complexes*

1. Démontrer que, pour tous nombres complexes z et z' , on a $|z+z'|^2 + |z-z'|^2 = 2(|z|^2 + |z'|^2)$.
2. Démontrer que, pour tous nombres complexes u et $v, |u| + |v| \leq |u+v| + |u-v|$. Déterminer les couples (u, v) qui correspondent au cas où il y a égalité.
3. Montrer : $\forall z \in \mathbf{C}, |z| < \frac{1}{2} \Rightarrow |(1+i)z^3 + iz| < \frac{3}{4}$.
4. Déterminer les racines carrées du nombre complexe : $-7 + 24i$.
5. Résoudre $|z+4-3i| = |z|+5$.
6. Résoudre dans \mathbf{C} l'équation $z^4 + 1 = 0$. En déduire une factorisation du polynôme $X^4 + 1$ en produit de deux polynômes à coefficients réels.
7. Résoudre dans \mathbf{C} l'équation $\bar{z} = az + b$, avec a et b complexes, et a non nul.
8. Montre que, si z est réel, alors $\left|\frac{z-i}{z+i}\right| = 1$. Réciproquement, si $u = e^{i\theta}$ pour un certain θ réel, peut-on écrire u sous la forme précédente avec z réel ? A-t-on ainsi construit une bijection entre \mathbf{R} et \mathbf{U} ?
9. Soit z_1 et z_2 deux complexes. Montrer que, si un complexe u vérifie $u^2 = z_1 z_2$, alors on a $|z_1| + |z_2| = \left|\frac{z_1+z_2}{2} + u\right| + \left|\frac{z_1+z_2}{2} - u\right|$.
10. Soit (ABC) un triangle du plan. On note a, b, c les affixes respectives de ses sommets. Montrer que (ABC) est équilatéral si et seulement si $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = 0$.
11. Donner une forme algébrique de $e^{i\pi/3}$ et de $e^{-i\pi/4}$. Donner une forme algébrique du produit et en déduire les valeurs exactes de $\cos(\pi/12)$ et de $\sin(\pi/12)$.
12. Soit z le complexe $e^{2i\pi/5}$. Montrer $1 + z + z^2 + z^3 + z^4 = 0$. En déduire $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) = -\frac{1}{2}$ et $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) = -\frac{1}{4}$. Donner la valeur exacte de $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$.

Exercice 4 *Arithmétique (*)*

1. Montrer que $\forall z, z' \in \mathbf{C}$, $|zz'| = |z| \times |z'|$. Que devient cette relation, si l'on note $z = a + ib$ et $z' = c + id$, des entiers de Gauss? (c'est-à-dire si $a, b, c, d \in \mathbf{Z}$).
2. Montrer que 5, 13 et 17 peuvent s'écrire chacun comme (au moins) une somme de deux carrés d'entiers. En déduire que 1105 peut s'écrire comme (au moins) une somme de deux carrés.
3. Montrer qu'il est possible de faire huit décompositions de cette forme (différentes, dont les nombres sont positifs).
4. En déduire que le quart de cercle ($x > 0, y > 0$) de centre O et de rayon $R = \sqrt{1105}$ passe par 8 entiers de Gauss dont on donnera les coordonnées.
5. On note $A(31 + 12i)$, $B(24 + 23i)$, $B'(24 + 12i)$ et $A'(-31 + 12i)$. Montrer $\widehat{AOB} = 2\widehat{AA'B} = 2\widehat{B'A'B} = \arctan \frac{1}{5}$.
6. En généralisant l'étude précédente, en déduire

$$\frac{\pi}{4} = \arctan \frac{4}{33} + 2 \arctan \frac{1}{13} + 2 \arctan \frac{1}{21} + 2 \arctan \frac{1}{5} + \arctan \frac{1}{47} .$$

Que penser et que faire de cette formule?