

Exercice 1 *Formule de Taylor*

1. Calculer $\Delta^2 y$ pour $y : x \mapsto x^3$ et montrer que $\Delta^2 y$ divisé par $(\Delta x)^2$ tend vers $6x$ lorsque Δx tend vers 0.
2. Soit $y = \sin(x^2)$ pour x réel. Calculer son développement de Taylor au voisinage de 0 en calculer les dérivées successives $y^{(n)}(0)$. Y a-t-il un autre moyen ?
3. Soit $y = uv$ un produit de deux fonctions. Leibniz a démontré en 1710 qu'on a $y' = u'v + uv'$, $y'' = u''v + 2u'v' + uv''$, $y^{(3)} = u^{(3)}v + 3u''v' + 3u'v'' + uv^{(3)}$. Trouver la formule générale et la démontrer.
4. Donner le développement de tangente à l'ordre 5 grâce à la formule de Taylor. Comparer ce calcul à celui obtenu en faisant le quotient des développements de sinus et cosinus.

Exercice 2 *Arcs paramétrés cartésiens*

1. Soit la courbe plane définie par $(x, y) = \left(\frac{t^2 + 1}{2t}, \frac{2t - 1}{t^2} \right)$. Étudier les points stationnaires.
2. Soit la courbe plane définie par $(x, y) = \left(\frac{1}{t^4 - 1}, \frac{t^3}{t^4 - 1} \right)$. Faire l'étude des branches infinies.
3. Soit la courbe plane définie par $(x, y) = \left(\frac{t^2 + t + 1}{t + 1}, \frac{t^2 - 1}{2 - t} \right)$. Faire l'étude des points doubles.
4. Soit la courbe plane définie par $(x, y) = (a \cos^3(t), a \sin^3(t))$. Faire l'étude des symétries.
5. Étudier et tracer la lemniscate de Bernoulli définie par $(x, y) = \left(\frac{t}{t^4 + 1}, \frac{t^3}{t^4 + 1} \right)$.
6. Étudier et tracer le folium de Descartes défini par $(x, y) = \left(\frac{t}{t^3 + 1}, \frac{t^2}{t^3 + 1} \right)$.
7. Étudier et tracer la courbe définie par $(x, y) = (2 \cos(t) + \cos(2t), 2 \sin(t) - \sin(2t))$. D'où vient son nom : hypocycloïde (à trois rebroussements) ?
8. Étudier et tracer la courbe définie par $(x, y) = \left(\frac{e^t}{t + 1}, \frac{te^t}{t + 1} \right)$.
9. Étudier et tracer la courbe définie par $(x, y) = (\cos^2(t), \cos(t)(1 + \sin(t)))$. Soit $M(t)$ un point de la courbe, différent de l'origine. Prouver qu'il existe un unique point $M(u)$ de la courbe, différent de l'origine, tel que $(OM(t))$ et $(OM(u))$ soient perpendiculaires. Déterminer le lieu du milieu des segments $[M(t); M(u)]$.
10. Soit la courbe plane définie par $(x, y) = (t \cos(t) - \sin(t), 2 \cos(t))$. Déterminer les points stationnaires et préciser leur nature. Montrer que les tangentes en ces points passent toutes par un même point.
11. Étudier et tracer la courbe définie par $(x, y) = (a \cosh^3(t), b \sinh^3(t))$ (avec a et b deux réels strictement positifs). La tangente en un point $M(t)$ de la courbe coupe les axes de coordonnées en A et B . Déterminer le lieu des points P tels que $(OAPB)$ soit un rectangle.
12. Sans utiliser la calculatrice, reconnaître la courbe définie par $(x, y) = \left(\frac{t^2 + 2t - 1}{t - 1}, \frac{t^2 + 3t - 2}{1 - t} \right)$.

Exercice 3 Arcs paramétrés polaires

1. Soit la courbe définie par $\rho = \frac{1}{4 + 3 \cos(\theta)}$. Réduire le domaine d'étude à $[0; \pi/3]$ et préciser les symétries. Étudier les points d'inflexion
2. Soit la courbe définie par $\rho = 1 + 2 \cos(\theta) - 4 \cos^2(\theta)$. Montrer que le domaine d'étude peut être réduit à $[-\pi; \pi]$. Établir que l'origine est un point multiple et qu'il existe deux autres points multiples.
3. Étudier la branche infinie au voisinage de $\pi/4$ par valeurs inférieures, de la courbe définie par $\rho = \frac{\tan(\theta)}{\cos(2\theta)}$.
4. Étudier et tracer la courbe définie par $\rho = \exp(\theta)$ (on étudiera $\tan(\vec{v}^\wedge)$).
5. Étudier et tracer la courbe définie par $\rho = \frac{\theta}{\theta - 1}$.
6. Étudier et tracer la courbe définie par $\rho = 1 + \cos(\theta)$ (on étudiera $\tan(\vec{v}^\wedge)$).
7. Étudier et tracer la courbe définie par $\rho^2 = \cos(\theta)$.
8. Étudier et tracer la courbe définie par $\rho = \sin^2(\theta)$.

Exercice 4 La cissoïde de Dioclès (*)

1. La cissoïde de Dioclès est engendrée par un cercle Γ et une droite D tangente au cercle en A . Si O est le point diamétralement opposé à A sur le cercle, la cissoïde est l'ensemble des points M tels que $\vec{OM} = \vec{M_1M_2}$ où M_1 et M_2 sont deux points alignés avec O situés respectivement sur Γ et D . Montrer que cette courbe possède l'axe (OA) comme axe de symétrie et la droite D comme asymptote
2. Montrer qu'on peut écrire une équation de cette courbe en coordonnées polaires $\rho = 2a \frac{\sin^2(\theta)}{\cos(\theta)}$. Préciser l'intervalle d'étude.
3. Montrer qu'on peut écrire une équation cartésienne de cette courbe sous la forme $y^2 = \frac{x^3}{2a - x}$.
4. Montrer qu'on peut écrire une équation paramétrique de cette courbe sous la forme $(x, y) = \left(2a \frac{t^2}{1+t^2}, 2a \frac{t^3}{1+t^2} \right)$.
5. Soit M'_1 le symétrique de M_1 par rapport à la médiatrice de $[O; A]$. Montrer que M appartient à la droite D_M perpendiculaire à (OA) passant par M'_1 .
6. Soit B et F les intersections de D_M avec (OA) et Γ , F étant choisi dans le demi-plan par rapport à (OA) qui ne contient pas A . On se donne une longueur ℓ et on fait la construction suivante : soit C et E tels que $\vec{BC} = \vec{OE} = \ell$. Soit H le point de D_M tel que (CF) et (EH) soient parallèles. Montrer qu'on peut choisir ℓ , indépendamment de M , de sorte que (AM) ait même direction que la tangente en M à la cissoïde.
7. En déduire un tracé de la cissoïde.
8. Montrer que la cissoïde de Dioclès est une duplicatrice : si P est sur la perpendiculaire à (OA) passant par O et tel que $OB = 2OA$, et si Q est le point d'intersection de Γ avec (AP) , le point d'intersection R de (OQ) avec la perpendiculaire à (OA) passant par A est tel que $AR = \sqrt[3]{2}OA$.